

LA MÉTÉO DES CULTURES

L'ACTU **EN PLAINE**
DU 02/03/2026

Sommaire

L'édito	p 2
La minute biologie végétale	p 3
Colzas.....	p 5
Céréales d'automne	p 8
Orges de printemps, pois et féverole de printemps	p 10
Lin d'hiver	p 11
Prairies	p 12
Nos offres à pouvoir	p 13



Cliquez sur les
parties du
sommaire
pour atteindre
celles qui vous
intéressent

L'édito

Temps radieux annoncé pour les 10 prochains jours, après un Février avouons-le un peu maussade. Quelques épisodes pluvieux anecdotiques tout au plus, mais globalement un contexte sec, lumineux et portant. Autrement dit : la campagne 2026 est officiellement sur les rails.

Entre la fertilisation des Colzas, les apports sur Céréales, l'entretien des Lins d'hiver, les préparations de terres à Betteraves et Lins de printemps et les derniers ajustements des itinéraires culturaux de printemps, nous voilà véritablement plongés dans cette nouvelle campagne.

Et avec elle revient ce qui fait aussi le sel de nos métiers : le pari et les hypothèses. Car n'oublions pas que l'Agronomie est une science, mais c'est aussi et surtout pour nous, à la Ferme Pilote une discipline d'anticipation: ça fait une belle jambe de recevoir une alerte sms sur une problématique alors qu'on aurait pu l'anticiper, non? Nos décisions reposent souvent sur des suppositions — toujours bâties sur l'expérience et la biologie, rassurez-vous — mais des suppositions quand même.

Alors les questions arrivent naturellement : de quoi sera fait le printemps, sera-t-il sec, connaîtrons-nous une forte pression maladies, les ravageurs seront-ils précoces, discrets ou explosifs, les réserves hydriques tiendront-elles jusqu'aux stades clés, va-t-on encore se manger une peau de banane réglementaire..... ?

Plutôt que d'attendre que cela nous tombe dessus, comme d'habitude, nous allons nous risquer à faire quelques projections basées sur la biologie pour essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver dans les semaines à venir.

Bien entendu, nous ne sommes ni marabouts, ni voyants, ni sorciers. Tout cela reste sous couvert de la prochaine mise à jour météo... parce qu'en agriculture, comme toujours, c'est elle qui aura le dernier mot.

Et d'ailleurs en termes de météo, faisons un petit point: il est tombé en moyenne sur la région 70 mm en Février - rien d'exceptionnel- et le niveau des nappes phréatiques (non encore impactés par ces dernières pluies), s'il est en remontée, reste préoccupant. On peut considérer qu'il n'y aura désormais plus de recharge et il va falloir vivre désormais sur la Réserve Utile de la parcelle, la capacité de la plante à gérer l'eau, la pluviométrie naturelle plus que sur les coups de pouce des enrôleurs, qui dépendent des potentiels arrêtés sécheresse. Bref, on ne sait rien du printemps, mais dès à présent ça ne coûte rien de mieux valoriser les "mm"!




LA MINUTE BIOLOGIE VÉGÉTALE

Les stades des céréales, ils dépendent de quoi ?

Après un automne 2025 globalement dans les normales, très loin des excès chauds que nous avons déjà connus, le scénario a brutalement changé à partir de la mi-janvier. Les tempêtes hivernales ont apporté beaucoup d'humidité... mais aussi une douceur marquée.

Depuis le 10 janvier, l'anomalie thermique est franchement positive sur tout le territoire. Alors qu'entre octobre et fin décembre le cumul thermique était proche de la moyenne (+4 %), la situation s'est nettement accélérée depuis le 1er janvier avec +70 à +130°Cj base 0°C selon les régions, soit environ +30 % en moyenne.

Figure 2 : Evolution des cumuls de températures entre le 1er octobre et le 3 mars – Station météo de Boigneville (91)



Très nette accélération des stades depuis la mi janvier, à l'image de 2020 et 2024

Mais attention : en agronomie, le cumul thermique ne suffit pas à expliquer la précocité. Le type variétal est aussi une part importante du phénomène: ainsi, si la plupart des variétés sont bridées par une sensibilité à la photopériode, et ne peuvent donc pas entamer leur montaison avant une certaine durée du jour, d'autres à l'image de CAMPESINO, KWS SPHERE ou PRESTANCE pour ne citer qu'elles, n'y sont pas du tout réactives: elles pourront donc être à épi 1 cm dès, parfois, début Février.

En automne, la douceur influence peu la précocité des céréales d'hiver, car la vernalisation et la durée du jour limitent le développement. En revanche, elle favorise un tallage intense : **c'est la raison pour laquelle certaines parcelles de début Octobre sont aujourd'hui des "pâtures"**. En janvier/février, ces freins disparaissent progressivement. La douceur agit alors directement sur la phénologie : chaque degré supplémentaire accélère les stades.

LA MINUTE BIOLOGIE VÉGÉTALE (SUITE)

Les stades des céréales, ils dépendent de quoi ?

Pour les céréales de printemps semées à l'automne, l'effet est encore plus direct : un automne doux précocifie fortement les stades.

En 2025-2026, plusieurs facteurs s'additionnent :


- des semis précoces et réussis,
- des levées rapides en sol encore chaud,
- des cultures bien développées avant l'hiver,
- une forte anomalie thermique depuis mi-janvier qui a effacé le refroidissement lié au gel.

Résultat : dans les situations saines, le développement sera précoce.

En revanche, dans les parcelles hydromorphes ou gorgées d'eau, l'effet sera atténué. Un sol saturé se réchauffe plus lentement, et une plante en stress a un métabolisme ralenti.

Les modèles annoncent désormais un stade ÉPI 1 CM en avance de 1 à 2 semaines dans les parcelles non pénalisées, soit vers le 15/20 Mars.

Si la douceur se maintient, l'accélération pourrait se poursuivre.



COLZA

Les parcelles changent vite d'allure et ont presque toutes attaqué leur réveil, sauf sur celles pénalisées par de l'hydromorphie ou des attaques fortes de ravageurs.

La reprise de végétation a eu lieu : on agrandit le bouton STOP DESHERBAGE COLZAS, car à en juger les coups de fil reçus, tout le monde ne l'avait pas vu



Désormais seule la CLOPYRALIDE est possible, avec **LONTREL 100 0.8 à 1 l/ha** efficace uniquement sur des flores telles que Chardons, Laiterons, Matricaires.

RAVAGEURS

Quelques Charançons de la tige sont signalés à droite à gauche, mais nous n'en sommes qu'au début de leur arrivée, qui s'intensifie dès 12°C - autant dire que cette semaine leur sera favorable. Après les premières captures en cuvettes jaunes, comptez 6 à 10 jours pour positionner un insecticide de type **SPLIT EXPERT 0.05 l/ha + ACTEON 0.05 %** : c'est le meilleur moyen de cibler un maximum de femelles juste avant leurs pontes.

Erratum Minecto Gold : Une erreur s'est glissée dans notre météo des cultures du 16/02. L'utilisation du Minecto Gold est interdite depuis le 31/12, suite à la fin de sa dérogation.

Les infestations sont toujours hétérogènes, le meilleur moyen de suivi reste la cuvette jaune mais on peut également utiliser l'outil de suivi mis à disposition par Terres Inovia :

<https://www.terresinovia.fr/fr/oad/prediction-des-vols-de-ravageurs>




COLZA (SUITE)

HYDROMORPHIE

Certaines parcelles ont été sujettes à ennoïement temporaire plus ou moins marqué. Dans ces conditions d'anoxie, le pivot peut pourrir et condamner la plante lors de la reprise de végétation. Il conviendra d'évaluer les zones impactées et la conduite à tenir: en cas de retournement, contactez votre Technicien car l'utilisation de Propyzamide, par exemple, sur la parcelle, peut exclure certaines cultures de remplacement.

Dans la majorité des cas heureusement, il ne s'agit que de ronds et de mouillères. Dans ce cas, petite astuce pour éviter que ce soit la foire aux adventices: semez à la main un mélange de CIPANs ou autres, à port assez bas, pour couvrir le sol et éviter qu'après la moisson on ait un rond trop sale !



COLZA (SUITE)



FERTILISATION


Il faut impérativement que le Soufre soit apporté au plus vite pour couvrir les besoins qui vont désormais devenir exponentiels.

Pour ajuster au mieux la fertilisation :

- Utilisation possible de la réglette Terres Inovia: [Réglette azote colza Terres Inovia](#)
- Ou, encore mieux, FARMSTAR, pour un pilotage encore plus fin

Concernant le fractionnement, on comment dès la reprise de végétation sur les fortes doses bilan, pour le reste, on a le temps :

Fractionnez l'apport d'azote



Dose à apporter (kg/ha)	Reprise de végétation (stades C1-C2)	Début montaison (stades C2-D1)	Boutons accolés (stades D1-D2)	Boutons séparés (stade E)
< 100			< 100	
100 à 170		60 à 80	40 à 90	
> 170	40 à 60	50 et +		40 à 60

Concernant les autres éléments nutritifs, la recette reste la même :

- 75 kg de soufre
- 500 g de bore
- 50 g de molybdène

On peut commencer les apports de **NUTRI BMO 3 l/ha** sur les parcelles en élongation

CÉRÉALES D'AUTOMNE



DESHERBAGE

On peut attaquer les rattrapages anti-dicots et finir les anti-graminées, avant qu'elles aussi ne dépassent des stades incontrôlables :

- Si les sulfos répondent encore sur la parcelle, un **MEDZO 1,5 l/ha** permet de recharger en **DFF**, ou on partira plutôt sur **OLBLAK DUO 1 l/ha** sur les cibles Ray-Grass ou sur **ATLANTIS PRO 1.5 l/ha** sur les cibles Vulpins.
- Dans le doute de l'état des résistances, associer **SULFOS + DIMs** donne généralement de bons résultats dans nos essais, avec plusieurs combinaisons possibles: **MEDZO + TOUNDRA**, **OLBLAK + ALKERA**, **ATLANTIS + DYVEL**..... doses et molécules à adapter en fonction des cibles. Sachant bien qu'il s'agit ici d'un coûteux coup de poker si l'on n'est pas sûr du niveau de résistance sur la parcelle.
- Pour des solutions à base de **PINOXADEN**, il faut clairement attendre des températures plus poussantes autour de 12°C - qu'on aura cette semaine

Attention : sur les graminées passé le stade 2 feuilles, un renfort foliaire adjuvanté est indispensable (**VOLCANE DUO 0.75 l/ha**) mais incompatible avec du Chlortoluron pour des raisons de sélectivité.

Du côté des dicotylédones, voici quelques solutions, non exhaustives sur les principales flores de sortie d'hiver :

- AMMI MAJUS / ANTHRISQUE : toutes sulfos --> **AVALETTA 1 l/ha**, **POINTER 30-35 g/ha**
- COQUELICOTS sensibles ALS : toutes bases sulfos --> **AVALETTA 1 l/ha**, **FLORID 0.15 l/ha**, **POINTER 35 g/ha**
- COQUELICOTS résistants ALS : hormones uniquement --> **FRIMAX 0.5 l/ha**, **TREZAC 0.2 l/ha**
- GAILLET, RUMEX : amidosulfuron, florasulame --> **FLORID 0.15 l/ha**, **BOCAGE XPERT 0.5 l/ha**
- MATRICAIRES sensibles ALS, STELLAIRES : toutes sulfos --> **BOCAGE XPERT 0.5 l/ha**, **MEDZO 1.5 l/ha**, **AVALETTA 0.8 à 1 l/ha**
- MATRICAIRES résistantes ALS : clopyralide et aminopyralide --> **FLORID 0.15 l/ha + ou puis EFFIGO 1.5 l/h ou TREZAC 0.2 l/ha**

Ici aussi l'adjuvantation est un fort facteur de réussite : par exemple, **DIFFUZ 0.5 l/ha + PHYDEAL 0.25%**

CÉRÉALES D'AUTOMNE (SUITE)



MALADIES

L'arrivée du stade Epi 1 cm, c'est aussi la gestion potentielle en préventif de la Rouille Jaune qui, les années passant, devient primordiale sur les variétés sensibles - rappelons-les principales: CELEBRITY, PRESTANCE, CAMPESINO, COMPLICE, RGT FARMEO, LG AUDACE, CHEVIGNON, RGT LOOKEO, SU SAUVIGNON

Dans ces situations, une gestion en amont avec 100g d'azoxistrobine ou de tébuconazole (**AMISTAR 0.4 I/ha ou MAYANDRA 0.5 I/ha + Pentra 0.15%**) permet d'éviter des situations explosives en cours de montaison et à moindre coût



FERTILISATION

Là, c'est parti pour la ferti, mais il va falloir adapter à la parcelle. Voici les principaux éléments à avoir en tête :

- Sur les sols frais de reprise de végétation, l'efficacité de l'azote est mauvaise, celui-ci est réorganisé dans la matière organique et c'est pour cela que les outils de conseil préconisent de fortes doses en cycle.

Les Blés, contrairement à la croyance collective, ne valorisent pas des doses importantes de type « 80 U ».

- Après cet hiver plutôt sec et des épisodes de gel, il faudra veiller à rappuyer les sols soufflés par un roulage, et anticiper une possible carence en **MANGANÈSE** avec **NUTRICER 3 I/ha, POLYACTIV MN 2,5 I/ha ou ACTIFLOW MCZ 1,5 I/ha**.
- **Les synthèses actuelles (environ 800 parcelles au 1er Mars) de Reliquats Sortie Hiver nous reviennent avec une moyenne de 85U soit 20 points de plus qu'en 2025, mais avec un écart allant de 25 à 125 U!**

Notre conseil : dans un contexte d'azote plutôt cher, chaque unité est précieuse et le pilotage par reliquats ou, encore mieux, par FARMSTAR, est important.

- Le risque de carence en **SOUFRE** est actuellement de « moyen » à « important » selon la pluviométrie reçue chez vous et le type de sol. Estimez-le grâce à la grille risque soufre ARVALIS.

- Sur des Blés mal enracinés, en deuxième paille ou dans des sols alcalins, un petit coup de pouce Phosphore (20 U) peut donner un bon coup de fouet pour fabriquer des racines.
- Depuis 15 jours, on observe une accélération des stades avec une prévision médiane pour la région du stade Epi 1 cm vers le 15 Mars.
- Sur les parcelles à très fort peuplement, ça fait mal au cœur à voir, mais il faut provoquer une faim d'azote pour que la plante élimine les talles les moins viables: en cas de printemps stressant (excès comme déficit d'eau), les fortes biomasses sont toujours pénalisantes!

SEMIS D'ORGES DE PRINTEMPS, POIS ET FEVEROLES DE PRINTEMPS

Il va bientôt être trop tard ! En particulier dans les petites terres, les semis avant le 15/02 limitent l'exposition à des coups de chaud de fin de cycle. Cela restera toujours un coup de poker, car un gros coup de froid tardif nous expose à du gel d'épi, mais désormais nous risquons plus le coups de chaud de Juin que le coup de froid de Mars: tout est question de balance "Bénéfice / Risque" — niveau densité, voici les bases :

- **ORGES DE PRINTEMPS**

- de **300 grains/m²** dans les **limons**,
- à **450 grains/m²** dans les **biefs**

- **POIS et FEVEROLES DE PRINTEMPS**

- Pois : **70 à 110 grains/m²** selon le type de sol
- Féverole : **40 à 60 grains/m²** selon le type de sol

Pour ces 2 cultures, un désherbage sur le semis avec des bases ACLONIFEN / CLOMAZONE / PENDIMETHALINE, modulées en fonction de la flore présente (type **TOUTATIS DAMTEC + NIRVANA S**) est quasiment incontournable, car les rattrapages en post levée sont très limitées



POIS ET FEVEROLE D'HIVER

Les épisodes de gel auront sans doute provoqué des lésions qui risquent d'occasionner de la bactériose.... contre cette maladie, aucune solution homologuée à ce jour.

Seule une application de cuivre, type **BETACUIVRE 3 l/ha**, peut éventuellement former une barrière bactéricide et limiter les contaminations secondaires.

Depuis quelques campagnes, l'Ascochyte et la Colletotrichose ont conduit à modifier les programmes de protection fongicide, avec des interventions plus précoces, dès la mi-février.

Les stratégies reposent sur une association triazoles + strobilurines, par exemple :

- **PROSARO 0,6 l/ha + AMISTAR 0,6 l/ha**
- **ARTINA 0,6 l/ha + AMISTAR 0,6 l/ha**

Ces interventions sont à réaliser avec adjuvant, dès que les conditions deviennent favorables vers début Mars : il nous reste du temps pour faire le tour des parcelles.



Ascochyte sur Pois d'hiver

LIN D'HIVER



Quel beau redémarrage sur nos Lins d'hiver, avec des parcelles homogènes et vigoureuses dans l'ensemble! C'est très bien parti, et sur une année où nos locomotives habituelles que sont la Patate et la Betterave risquent de moins tirer, raison de plus de les bichonner !



MALADIES

Il faut au plus vite protéger de la courbure, si cela n'a été fait, avec un **AMISTAR GOLD 0.5 l/ha** adjuvanté de **PENTRA 0.15%**

Dès le stade 15/20 cm, on pourra attaquer la protection base soufrée avec, par exemple **SULFORIX RAINFREE 2.5 à 3 l/ha** ou **AQUICINE DUO 2 l/ha**

DESHERBAGE

Il faut également terminer rapidement les interventions pour ne risquer aucune phytotoxicité qui entraverait la montaison.

Voici quelques articulations possibles mais bien entendu non exhaustives :

- Vulpins/ RG peu résistants : **NOROIT 1 l/ha + VOLCANE DUO 0.5 à 0.75 l/ha**
- Vulpins / RG assez résistants : **NOROIT 1 l/ha + DEVIN 2 l/ha + VOLCANE DUO 0.75 l/ha**
- Vulpins / RG totalement résistants : la messe est dite, il faut accepter la défaite (et prévoir de la Colzamide l'an prochain)
- Coquelicots sensibles ALS : **CHEKKER 0.2 + BASAGRAN SG 0.5+ MYSA 1**
- Coquelicots résistants ALS : **METISS 0.25 + BASAGRAN SG 0.4 + MYSA 1 (si températures et Lin > 8 cm)**
- Rumex, Vivaces : **ALLIE SX 15 g + GRATIL 20 g/ha / LONTREL 100 1 l/ha + MYSA 1** si et seulement si températures derrière application
- Renouées : **ALLIE SX 15 g + CHEKKER 0.2 + MYSA 1**
- Toutes dicots : **CHEKKER 0.2 + BASAGRAN SG 0.4 à 0.5 + MYSA 1**

NUTRITION ET SOUTIEN DE CROISSANCE

Côté fertilisation, on va pouvoir amener l'azote en fonction de la dose bilan, en n'oubliant pas qu'un excès est toujours néfaste.

On peut attaquer vers 10 cm le programme de soutien à la plante avec dans un premier temps **NUTRILIN 3 l/ha**, qu'on complètera vers 40 cm en séquençage avec d'autres technologies (**FERTIGOFOL 5 l/ha**, **LALSTIM OSMO 0.5 à 1 kg**...mais on a encore un peu de temps !)

PRAIRIES



La fertilisation azotée peut démarrer, les 200 degrés base 0 sont atteints partout en région. Comme pour toute culture, se pose la question du désherbage mais les sulfos sont déconseillées en reprise de végétation car elles limitent la poussée de l'herbe. Restent donc les hormones qui ont besoin de températures poussantes, ce qui reste donc une possibilité cette semaine si la douceur se confirme. **Nous ne sommes que début Mars, les nuits restent fraîches: dans le doute, il vaudra toujours mieux attendre que gâcher une cartouche.**

Exemples de flores courantes :

- STELLAIRES (mouren): **STARANE 200 1 l/ha** ou **ARIANE NEW 2.5 l/ha**
- RUMEX: **BANVEL 4S 0.6 à 1 l/ha** (selon qu'il s'agit de Rumex de semis ou Rumex "souches")
- PISSENLITS: **ARIANE NEW 2.5 l/ha**

Dans tous les cas un diagnostic de flore sera utile pour ajuster les interventions. Dans l'immense majorité des cas, les adventices sont d'ailleurs des bioindicateurs et sans résolution des problématiques, on pourra revenir tous les ans en herbicide!

N'oublions pas Hersage et Déprimage qui permettent également de déplaçonner la production à hauteur de 1 TMS/ha.

NOS OFFRES À POURVOIR

Alternant Maintenance - Gouy-sous-Bellonne - F/H

Responsable de silo - CDI - Gouy-St-André - F/H

Exploitant transport et logistique - CDI - Gouy sous Bellonne - F/H

Chargée de communication - CDD 9 mois à partir d'Avril - F/H

Chauffeur Poids Lourd secteur Ledinghem - CDI - F/H

6 Alternants technico-commerciaux production végétale pour la rentrée 2026 - F/H

2 Alternats technico-commerciaux production animale pour la rentrée 2026 - F/H

1 Alternant en marketing et analyse de données pour la rentrée 2026 - F/H

Pour consulter l'ensemble de nos offres d'emploi, [cliquez ici.](#)

N'hésitez pas à en parler autour de vous !

Pour postuler c'est simple, il suffit d'envoyer son CV et sa lettre de motivation à **recrutement@groupe-carre.fr**