

LA MÉTÉO DES CULTURES

L'ACTU **EN PLAINE**
DU 31/08/2026



**LA FERME
PILOTE**
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

Sommaire

Edito : Quand il y a de l'eau y a d'la vie. Et quand y a d'la vie y de l'espoir !.....	p 2
La minute biologie végétale.....	p 3
Colza.....	p 4
Gestion de l'interculture.....	p 7
Lins	p 9
Betterave	p 9
Pomme de terre.....	p 10
Maïs et fourrages.....	p 12
Nos offres à pourvoir.....	p 13



Cliquez sur les
parties du
sommaire
pour atteindre
celles qui vous
intéressent

L'édito

Quand il y a de l'eau y a d'la vie. Et quand y a d'la vie y a de l'espoir !

C'est un peu l'impression générale qu'on ressent en regardant la plaine reverdir ces derniers jours. Quelle remontada !

Le retour de l'eau a changé l'aspect de la plaine, a relancé la campagne 2027, sauvera sans doute quelques tonnes de Betteraves ou des Pommes de Terre tardives, bref, nous donne du baume au cœur – et avouons-le, on en avait besoin !

Allez, désormais, on se projette dans l'avenir (nous aurons tout le loisir de refaire le match cet hiver quand nous aurons pris le temps d'analyser les résultats et les facteurs, surtout, de cette campagne 26) et l'avenir immédiat, ce sont les Colzas qui finalement vont bénéficier de conditions clémentes pour leur installation et leur désherbage. Après les Colzas, ce sont les CIPANs qu'on pourra semer avec, finalement, pas tant de retard que ça. Alors oui, on aurait préféré un semis un poil plus précoce mais en perspective de la violence météorologique de cet été 26, ne boudons pas notre chance et notre plaisir : tout semble s'arranger !

Allez, une petite Météo expresse car c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il va falloir rattraper le temps perdu ! Bon courage à tout le monde

PS: une pensée émue pour l'ensemble des enfants, collégiens, lycéens et étudiants qui vont reprendre le chemin de l'école en ce mardi. Soyez fort.e.s, il ne vous reste que 10 mois avant les prochaines vacances d'été 😊 Vous êtes des petits Colzas en quelque sorte, le cycle du Colza étant presque calé sur le cycle scolaire



Une carte qui fait du bien : enfin de l'eau !

LA MINUTE BIOLOGIE VÉGÉTALE

LES FAUX SEMIS : OÙ, QUAND, COMMENT ?

Le retour des pluies permet -enfin- de travailler les sols efficacement. Mais forcément, il va falloir rattraper le temps perdu alors une fois n'est pas coutume, cette Minute Biologie sera « CCP » : Claire, Concise, Précise

Nous allons pouvoir profiter de ce laps de temps derrière Colza, Pois, Blé, premiers arrachages de Pommes de Terre pour déstocker un peu de graminées

- Les Vulpins atteignent leur plus gros pic de levée annuelle sur début Septembre. Pour les Ray grass, les pics sont plus lissés avec des levées quasi permanentes sur l'année
- Pour être efficace, un faux semis doit être travaillé sur 2 à 4 cm maximum
- Le lit de semences créé doit être le plus fin et rappuyé possible : les levées se font toujours massivement dans les passages de roues
- Compter environ 150 à 200°jours pour voir la première feuille de la graminée soit environ en ce moment, 8 à 10 jours
- Prévoir une destruction au glyphosate pour éviter tout repiquage dans le semis de la culture d'automne
- Stopper les faux semis 15 jours avant semis de la culture pour ne pas enclencher de levées intempestives
- Un bon faux semis fera lever / germer quelques dizaines de graines au m2. Une parcelle présente de l'ordre de 7000 graines/ m2 : c'est un petit levier, intéressant mais insuffisant



Périodes de levée préférentielles des Vulpins des Champs



Levée ray grass- photo source Arvalis



COLZA

C'est revenu à temps, mais après le beau temps vient toujours la pluie et c'est tant mieux ! La plupart des parcelles a enfin pu être semée, avec globalement de bonnes conditions de fraîcheur et de structure. Quelques petits rappels et points d'attention ci-après :



DESHERBAGE

Le colza germe en 48h et lève en 4 à 5 jours

Bannir les solutions contenant de la Clomazone à stade rayonnant pour des problèmes de sélectivité. En revanche, les bases METAZACHLORE solo (**RAPSAN 500 SC**) ou associé à des molécules sélectives (**RAPSAN TDI, TORSO, LOGIX....**) peuvent être utilisées au stade rayonnant, en modulant les doses : par exemple, on passera à 2 l/ha maxi en **TORSO**



Colza semé le 25 Août à
Gouy Sous Bellonne (photo du 31/08)

Pour les désherbages sur semis, on peut considérer les conditions actuelles comme excellentes

COLZA (SUITE)

En revanche, la grosse « problématique » de l'année, à nuancer car cela se gère bien quand même si l'on ne se fait pas dépasser, ce sont les repousses de céréales

Il fallait s'en douter: pas de déchaumages pour faire germer les graines en amont, une seule préparation à la hâte donc tout germe dans le semis de Colza.

Assez logique puisque le Colza concourt en base 6°C quand l'Orge démarre à 0: chaque jour, elle bénéficie de 6°C de plus que le Colza dans son thermo périodisme

Que ce soit le Métazachlore ou la Napropamide, aucune solution de PSPL ne permet de contrôler efficacement les céréales. Dans un essai Ferme Pilote de 2022 cependant, le NERO 2.5 l/ha permettait la meilleure efficacité sur repousses de céréales

Il faudra attendre le stade COTYLEDONS BIEN DEPLOYES / 2 FEUILLES VRAIES pour intervenir avec une fop (**ETAMINES ou MACETA 0.8, LEOSHA 0.6 + VOLCANE DUO 0.5 l/ha**) et 4 feuilles pour une dim (ne tirons pas cette précieuse cartouche sur une orge!)

On peut cependant considérer que l'Orge aura pompé 5 à 10 kilos d'azote / feuille émise au détriment du Colza: à prendre en compte pour ajuster la fertilisation starter, et s'attendre à des faims d'azote sur des parcelles non fertilisées



Repousses d'escourgeons dans un semis du 20 Août

COLZA (SUITE)


RAVAGEURS

Les Colzas R26 n'ont pas encore été détruits et peuvent héberger des Petites Altises qui coloniseront les parcelles 27 lors de la destruction. Pas de problèmes de résistances, un **SPLIT ou KUSTI 0.05 + ACTEON 0.05%** suffiront

Concernant les Grosses Altises, elles devraient arriver comme à leur habitude vers le 15/20 Septembre, et trouver de ce fait des Colzas moins développés qu'à l'accoutumée. Il faudra donc surveiller particulièrement les parcelles cette année.

Enfin concernant les Limaces : même si depuis 3 mois elles ne doivent pas avoir une belle il ne faut pas oublier que le stock d'oeufs n'est pas à 0 et que le retour d'orages peut déclencher des naissances: dans tous les biefs, Colzas motteux, historiques chargés, il faut prévoir un suivi accru et intervenir si besoin avec **LUCIO PRO 5 kg/ha**

Rappel réglementation fertilisation :



Rappel réglementaire (source Terres Inovia)

La dérogation Minecto est tombée avec dispositions réglementaires (Berlese et OAD) mais attention, ne pas tirer la cartouche trop vite et surtout pas à la levée car le reste des solutions en situation de résistance "super KDR" est très léger : cela reviendrait à faire une battue à sangliers avec des munitions à grives...

Idéalement, on attendra la fin novembre voire décembre pour nettoyer les Colzas efficacement....mais on a encore un peu de temps

Minecto™ Gold

DEROGATION 120 JOURS

MINECTO GOLD (AMM 2220766) : Granulés dispersables (WG) contenant 400 g/kg de cyantraniliprole

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous informer de l'obtention de la dérogation pour le produit MINECTO GOLD. L'autorisation permet son utilisation sur colza, colza porte-graine et moutarde contre les grosses altises (Psylliodes chrysocephala).

Vous trouverez les éléments ci-dessous :

Informations relatives à l'utilisation

- Date de début de la dérogation : **25/09/2026**
- Date d'expiration : **23/01/2027**

Usage(s) autorisé(s)

Application avec un pulvérisateur à rampe

Usage		Informations sur l'application			Mesures de gestion du risque			
Cultures autorisées	Cibles	Dose (1)	Nombre (2)	Stade	DAR (3)	Zone non traitée	DSPPR (4)	CAF (5)
Colza			1/an	BBCH 16 à BBCH 19	F		5 m	-
Colza porte-graine	Grosse altise	100 g produit/ha	2 applications maximum tous usages confondus (Intervalle minimum : 14 jours)	Première application : BBCH 00 à BBCH 14 Deuxième application : BBCH 16 à BBCH 19	/	Aquatique : 20 m (dont DVP 20 m) Arthropodes : 5 m	5 m	-
Moutarde			2/an (Intervalle minimum : 14 jours)		F		5 m	-

GESTION DE L'INTERCULTURE



TRAVAIL DU SOL

C'est enfin parti pour les déchaumages avant implantation des couverts. Un passage de fissurateur, dans le cas de parcelles avec semelles de labour, sera toujours intéressant avant d'installer le couvert afin d'éviter la rupture de capillarité et le mauvais drainage de l'eau en cas d'hiver pluvieux

GESTION DES ETEULS

Les seules plantes ayant réussi à subsister sont les Chardons, les Chénopodes et quelques crucifères de cranettes comme les Résédas et les Anthriscues

Idéalement il faudrait un **GLYPHO + 2,4-D ou DICAMBA: ROUNDUP ULTIMATE 2 l/ha + CHARDOL 600 ou BANVEL 4S 0.4 à 0.6 l/ha + DIFFUZ 0.5 l/ha + PHYDEAL 0.25%**, mais c'est impossible si on compte semer quelque chose dans les semaines qui viennent: dans ce cas, se contenter de 1080g de glypho adjuvanté



Réséda : une crucifère en développement dans les petites terres

GESTION DE L'INTERCULTURE (SUITE)

COUVERTS

Nous nous posons tous beaucoup de questions sur l'installation des couverts, leur réussite, leur retour sur investissement...voici quelques éléments de réponse :

- Oui, effectivement passé le 15/08 les plantes comme les Tournesols et le Nyger auront du mal à exploser en végétation mais peuvent tout de même se développer
- Plus on sème tard, plus on a besoin de Crucifères robustes (Moutarde blanche, radis) ou de céréales (Seigle, Avoine)
- Tout dépendra de la météo de Septembre et de l'arrivée des premières gelées, fatales pour Sarrasin, Sorgho et Nyger. Sur une année si chaude avec El Nino en arrière plan, on peut espérer une arrivée tardive -voire pas- de gelées
- Les Vesces et Trèfles peuvent valoriser des semis tardifs tant qu'il y a de l'eau
- Dans tous les cas et si d'aventure vous souhaitiez changer de « recette » pour s'adapter à un semis tardif, gardez précieusement au sec les semences prévues. En effet, les accidents de production (perte de rendement, casse de graines) risquent fort d'impacter les coûts des légumineuses l'an prochain.
- Les tendances météo sur Septembre et Octobre sont encore à des anomalies positives de températures : ça vaut ce que ça vaut, mais d'après les experts, il n'est pas près de geler.

Bref, il est encore temps de semer des couverts ! Il est fort possible que dans ce changement de contexte climatique et exception faite des plantes photosensibles qui ont besoin de jours longs, nos références soient amenées à changer concernant les dates possibles de semis



*Semis de nos essais avant récolte
Fonqueviller - Gouy - Moreuil*



*Photo du 31/08/2026 :
Semis à la volée avant moisson à
Moreuil (80)*



LINS

Les nappes se resalissent un peu, on peut prévoir un glyphosate homologué sur nappes : **ROUND UP ULTIMATE 2 l/ha, avec 0.5 l/ha de VOLCANE DUO** (les conditions restent compliquées même pour un glypho haut de gamme prêt à l'emploi)



BETTERAVES

La culture et ses maladies étaient figées par la météo de ces dernières semaines, cela pourrait changer.

On peut donc rattraper la protection fongicide, profitant de la baisse des températures et d'un temps plus nuageux pour limiter l'effet stressant du Cuivre, sauf pour les premiers et seconds arrachages pour qui la messe est dite (pas de rentabilité des fongicides moins de 45 jours avant arrachage).

Avoir également en tête que Septembre peut signer l'arrivée de l'Oïdium et des Rouilles et que dans ce cas, il faut du difénoconazole

BETTERAVES (SUITE)

En fonction des molécules utilisées précédemment, on a le choix :

BAGANI 0.8 l/ha + DIFURE SOLO 0.4 l/ha

Ou **SPYRALE 1 l/ha**

Ou éventuellement, mais avec une faible protection Rouille, **YEARLING 1.2 l/ha**

Le tout adjuvanté : **OLIOFIX 0.5 %** ou **ACTEON 0.05%**

On voit également des Teignes en culture, qui nécessiteront une pyréthriinoïde.



Teignes (source ITB)



POMMES DE TERRE

Le retour de pluies sur les parcelles non irriguées risquent d'entraîner un rejumelage. Malheureusement, il est trop tard pour un passage d'hydrazide maléïque : il faut compter 3 semaines pour que le mécanisme se mette en place et avoir une bonne efficacité.

De même le retour de températures plus vivables relance le mildiou en parcelles irriguées, et en zones concernées par les précipitations. Le principal risque à cette époque est de contaminer les tubercules par des spores entraînées via les fentes dans les buttes

POMMES DE TERRE (SUITE)

MILDIU

On peut utiliser cyazofamide et propamocarbe pour protéger des situations tendues, par exemple **RANMAN 0.5 l/ha + SPORAX 1 l/ha + OLIOFIX 0.5%** ou également des bases plus simples de type **AKOLIT 0.5 l/ha + OLIOFIX 0.5%** sur des parcelles bien protégées jusqu'alors

DEFANAGE

Vérifier que les lenticelles soient bien fermées avant de défaner. Les défanages devraient être plutôt faciles cette année vu l'état de la végétation

Stratégie classique :

BROYAGE puis **GOZAI 0.8 l/ha + FOXY SG 0.5 kg/ha** ou **SPOTLIGHT 1l/ha + DIFFUZ 0.5 l/ha + PHYDEAL 0.25%**

En cas de chénopodes en mode « arbustes », le broyage sera le plus efficace. On peut prévoir de rajouter un **ROUNDUP ULTIMATE 1.5 l/ha**, en sachant bien que pendant le délai d'action (1 semaine environ), les graines continuent gentiment leur maturation



Mildiou



Champ PdT secteur Gouy-sous-Bellonne le 18/08

MAÏS / FOURRAGES



Les ensilages ont commencé, et confirment les rendements plutôt faibles ; En outre, les mauvaises fécondations conduisent à de faibles valeurs en amidon : il va donc falloir compenser ces pertes d'UFL au silo.

AVOINE VESCE (50 A 70 KGS/ HA MINI).

Investissement limité, possibilité de repartir sur un bon blé fin octobre. Valeur UFL/ PDI d'un Ray Grass-Trèfle. Inconvénient principal : réussite très dépendante des conditions météo de l'été, assez aléatoire. Rendement potentiel autour de 3 TMS. Il est possible de semer jusque début septembre pour espérer une belle coupe d'automne. Au-delà, c'est un peu illusoire et il faut basculer sur une dérobée d'hiver

DÉROBÉE D'HIVER

Type Ray Grass Italien + Trèfle Violet ou Incarnat (20 + 5 kgs).

Excellente qualité alimentaire, productivité sécurisée mais peut cependant assécher le sol au printemps .Rendement potentiel autour de 8 à 10 TMS


Résultat essai Clément Voiseux

Il existe de nombreuses manières de reconstituer des stocks fourragers, faites-vous aider de votre TC !

DÉROBÉES D'HIVER

Type Ray Grass Italien + Trèfle Violet ou Incarnat (20 + 5 kgs).

Excellente qualité alimentaire, productivité sécurisée mais peut cependant assécher le sol au printemps .



**Résultats essais
à Noyelle-Vion le 30/04**

Il existe de nombreuses manières de reconstituer des stocks fourragers, faites-vous aider de votre TC !

NOS OFFRES À POURVOIR

Assistant Administration des Ventes (ADV) - service Céréales - H/F - CDI - Gouy-sous-Bellonne

Agent de maintenance - F/H - CDI - Gouy-Sous-Bellonne

Assistant administratif service QHSE - F/H - CDI - Gouy-sous-Bellonne

Vous souhaitez nous rejoindre mais aucune offre ne correspond pas à votre profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature spontanée : <https://jobs.world.luccasoftware.com/groupe-carre/candidature-spontanee-d2e5867f-c127-4c1f-a928-fab5e6675609>

Pour consulter l'ensemble de nos offres d'emploi, *cliquez ici*.
N'hésitez pas à en parler autour de vous !