

LA MÉTÉO DES CULTURES

L'ACTU **EN PLAINE**
DU 14/09/2026



**LA FERME
PILOTE**
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

Sommaire

Edito : Les 7 plaies d'Egypte ?.....	p 2
La minute biologie végétale.....	p 3
Colza.....	p 4
Gestion de l'interculture.....	p 7
Betterave	p 8
Pomme de terre.....	p 9
Nos offres à pourvoir.....	p 10



Cliquez sur les
parties du
sommaire
pour atteindre
celles qui vous
intéressent

L'édito

Les 7 plaies d'Egypte ?

Décidément, l'année 2026 continue à déverser son flot d'évènements hors normes. Après 5 vagues de chaleur, un été parmi les plus secs jamais enregistrés, une année de loin la plus chaude de tous les temps, des hordes d'Altises sur les légumes d'été, des charançons Lixus en Betteraves, on aurait pu croire qu'on allait reprendre le cours normal des cultures. Hé bien non ! Désormais ce sont les Punaies qui attaquent nos Colzas, moins intensément que chez nos collègues plus au sud certes, mais quand même, on s'en serait bien passé. D'ailleurs, dans ces mêmes zones, des invasions de Sauterelles ont été signalées. Des Sauterelles ! et puis quoi encore ? Des Grenouilles ? Des Taons et des Moustiques ?

Pourtant, rien d'étonnant à tout cela. La hausse des températures entraîne d'une part une remontée des écosystèmes vers le Nord, donc des êtres vivants les occupant et, d'autre part, une accélération des cycles de développement des insectes notamment, ceux-ci étant calés comme les végétaux sur des sommes de températures. Autrement dit, « pu qu'y fait chaud, pu qu'ils vont pulluler ».

Faut-il s'avouer vaincus et condamnés à subir pour autant ? Bien sûr que non ! En 10 000 ans d'existence, nos métiers en ont vu passer des sécheresses, des ravageurs, des maladies et des problématiques au premier abord insolubles. Et chaque fois, nous avons trouvé une issue. Ça n'est jamais simple, mais pour peu qu'on sache s'adapter –et que nos chers décideurs nous laissent des solutions bien entendu- on arrive à contourner le problème.

En l'occurrence, il semble que nous soyons face à un changement de paradigme. Si dans les années 1980 / 2020 ce soient les maladies qui occasionnaient le plus de pertes de rendement, la recherche génétique combinée à des solutions fongicides puissantes, aidées par l'évolution du climat ont permis ces dernières années de limiter l'impact économique à un bruit de fond. Mais pendant ce temps, aidés par leur génétique plus résistante, un climat plus clément et des politiques plus déconnectés, les insectes ont fait une remontada assez incroyable. Car, si l'on regarde un peu dans le rétro, ils furent les premières causes de famine, notamment en attaquant les stockages, pendant des siècles. Si le 20ème siècle et ses avancées phytopharmaceutiques les réduisit au silence, il semblerait que le 21ème siècle marque leur retour.

Bref, pour faire court et simple, il va falloir désormais prendre l'habitude de surveiller un peu plus les bêtes dans les parcelles car les dégâts vont crescendo année après année. Et dans la plupart des cas, on dispose encore de solutions de protection.

METEO ARRAS (62000) ★




LA MINUTE BIOLOGIE VÉGÉTALE

Les faux semis : où, quand, comment ?

Le retour des pluies, hétérogène certes, a permis -enfin- de travailler les sols efficacement. Mais forcément, il va falloir rattraper le temps perdu alors une fois n'est pas coutume, cette Minute Biologie sera « CCP » : Claire, Concise, Précise.

Nous allons pouvoir profiter de ce laps de temps derrière Colza, Pois, Blé, premiers arrachages de Pommes de Terre pour déstocker un peu de graminées.

- Les Vulpins atteignent leur plus gros pic de levée annuelle sur début Septembre. Pour les Ray grass, les pics sont plus lissés avec des levées quasi permanentes sur l'année,
- Pour être efficace, un faux semis doit être travaillé sur 2 à 4 cm maximum,
- Le lit de semences créé doit être le plus fin et rappuyé possible : les levées se font toujours massivement dans les passages de roues,
- Compter environ 150 à 200°jours pour voir la première feuille de la graminée soit environ en ce moment, 8 à 12 jours,
- Prévoir une destruction au glyphosate pour éviter tout repiquage dans le semis de la culture d'automne,
- Stopper les faux semis 15 jours avant semis de la culture pour ne pas enclencher de levées intempestives,
- Un bon faux semis fera lever / germer quelques dizaines de graines au m2. Une parcelle présente de l'ordre de 7000 graines/ m2 : c'est un petit levier, intéressant mais insuffisant.



COLZA



La petite fenêtre de précipitations s'est vite refermée, laissant place à des conditions plus chaudes, venteuses et donc desséchantes.

Si la plupart des parcelles se portent plutôt bien, certaines commencent à souffrir de ces conditions redevenues sèches et dans les 10 prochains jours, on ne voit rien arriver pour le moment.

DESHERBAGE



Toute intervention de post levée anti dicot es stressante pour le Colza, donc dans ces conditions assez compliquées, on évitera de rajouter des problèmes aux problèmes: c'est aussi pour cela qu'on vous conseille toujours de passer sur le semis. Les bases METAZACHLORE solo (**RAPSAN 500 SC**) ou associé à des molécules sélectives (**RAPSAN TDI, TORSO, LOGIX....**) peuvent être utilisées au stade rayonnant, en modulant les doses: par exemple, on passera à 2 l/ha maxi en **TORSO**. La sélectivité est généralement bonne (Métazachlore) à acceptable (associations).



Colza - Gouy-sous-Bellonne


En revanche, la grosse « problématique » de l'année, à nuancer car cela se gère bien quand même si l'on ne se fait pas dépasser, ce sont les repousses de céréales.

Il fallait s'en douter: pas de déchaumages pour faire germer les graines en amont, une seule préparation à la hâte donc tout germe dans le semis de Colza.

Assez logique puisque le Colza concourt en base 6°C quand l'Orge démarre à 0: chaque jour, elle bénéficie de 6°C de plus que le Colza dans son thermo périodisme.

COLZA (SUITE)

On peut cependant considérer que l'Orge aura pompé 5 à 10 kilos d'azote / feuille émise au détriment du Colza: à prendre en compte pour ajuster la fertilisation starter, et s'attendre à des faims d'azote sur des parcelles non fertilisées.



Attention à la réglementation Azote pour l'apport en plein après levée: avant levée, on a le droit à 30U MAIS avant le 31/08. Au-delà, on a le droit à 10 U en localisé.

Il faudra attendre le stade COTYLEDONS BIEN DEPLOYES / 2 FEUILLES VRAIES pour intervenir avec une fop (**ETAMINES, LEOSHA 0.6 + VOLCANÉ DUO 0.5 l/ha**) et 4 feuilles pour une dim (ne tirons pas cette précieuse cartouche sur une orge!)

Les Vulpins et Ray Grass atteignent désormais 2 feuilles sur la plupart des implantations, et à condition que le Colza ait atteint le stade minimal, il va désormais falloir les gérer sous peine qu'ils ne passent au travers une fois leurs mécanismes de détoxification mis en place. Sur les parcelles à population relativement sensible, un **NOROIT 1 l/ha + DIFFUZ 0.5 l/ha + PHYDEAL 0.25%** suffira tandis que sur les populations plus résistantes, une double dim de type **NOROIT 1 l/ha + DEVIN 1 à 2 l/ha + adjuvant** sera nécessaire.



Repousses d'escourgeons dans un semis du 20 Août

COLZA (SUITE)

RAVAGEURS

Les Colzas R26 n'ont pas encore été détruits et peuvent héberger des Petites Altises qui coloniseront les parcelles 27 lors de la destruction. Pas de problèmes de résistances, un **SPLIT ou KUSTI 0.05 + ACTEON 0.05%** suffiront.

Les Grosses Altises ont commencé à pointer leur nez et le pic devrait arriver cette semaine à la faveur du temps doux et calme annoncé. Même si le MINECTO GOLD a eu sa dérogation, il est important de garder cette précieuse cartouche pour la gestion des larves en novembre : préférer **UPPERCUT 0.2 l/ha + ACTEON 0.05%**



Dégâts d'Altises

Les Punaies ont colonisé certaines parcelles dans la région (Montreuil sur mer, Valenciennes, Beauvais...). Aucune solution phyto n'est homologuée à ce jour, et dans des conditions expérimentales la moins mauvaise molécule serait la lambda cyhalothrine avec seulement 50% d'efficacité...pour le coup, nous sommes vraiment à cours de solutions !



Invasion de punaises

Les Pucerons vont être à surveiller sur les variétés sensibles TuYv comme HELYPSE ou BESSITO. Si plus de 20% des pieds sont porteurs, intervenir avec **TEPPEKI 100 g/ha**

Enfin concernant les Limaces; même si depuis 3 mois elles ne doivent pas avoir une belle il ne faut pas oublier que le stock d'oeufs n'est pas à 0 et que le retour d'orages peut déclencher des naissances: dans tous les biefs, Colzas motteux, historiques chargés, il faut prévoir un suivi accru et intervenir si besoin avec **LUCIO PRO 5 kg/ha**

SOUTIEN A LA CROISSANCE

Sur des parcelles qui patinent, soit parce qu'il n'y a pas eu de starter, soit parce que l'état hydrique du sol ne permet pas un bon fonctionnement des engrais, on peut choisir la voir foliaire avec **ACRECIO 5 l/ha**

GESTION DE L'INTERCULTURE



GESTION DES ETEULS

Les seules plantes ayant réussi à subsister sont les Chardons, les Chénopodes et quelques crucifères de cranettes comme les Résédas et les Anthrisesques.

Idéalement il faudrait un **GLYPHO + 2,4-D ou DICAMBA: ROUNDUP ULTIMATE 2 l/ha + CHARDOL 600 ou BANVEL 4S 0.4 à 0.6 l/ha + DIFFUZ 0.5 l/ha + PHYDEAL 0.25%**, mais c'est impossible si on compte semer quelque chose dans les semaines qui viennent: dans ce cas, se contenter de 1080g de glypho adjuvanté.




Réséda : une crucifère en développement dans les petites terres

BETTERAVES

La Cercosporiose reprend sa progression à la faveur du retour de conditions plus humides. On peut donc poursuivre la protection fongicide, **sur les parcelles non protégées depuis 3 semaines et arrachées dans plus de 45 jours.**

Avoir également en tête que Septembre peut signer l'arrivée de l'Oïdium et des Rouilles et que dans ce cas, il faut du difénoconazole.



En fonction des molécules utilisées précédemment, on a le choix :

BAGANI 0.8 l/ha + DIFURE SOLO 0.4 l/ha , AMISTAR GOLD 0.6 à 0.8 l/ha
ou **SPYRALE 1 l/ha.**

Le tout adjuvanté : **OLIOFIX 0.5 %** ou **ACTEON 0.05%.**

On voit encore des Teignes en culture, qui nécessiteront une pyréthrinioïde.



Teignes (source ITB)

POMMES DE TERRE



Le mildiou continue sa diffusion grâce aux températures douces et l'humidité revenue.

MILDIU

On peut utiliser cyazofamide et propamocarbe pour protéger des situations tendues, par exemple **RANMAN 0.5 l/ha + SPORAX 1 l/ha + OLIOFIX 0.5%** ou également des bases plus simples de type **AKOLIT 0.5 l/ha + OLIOFIX 0.5%** sur des parcelles bien protégées jusqu'alors.

DEFANAGE

Vérifier que les lenticelles sont bien fermées avant de défaner. Les défanages devraient être plutôt faciles cette année vu l'état de la végétation.

STRATÉGIE CLASSIQUE :

BROYAGE puis **GOZAI 0.8 l/ha + FOXY SG 0.5 kg/ha ou SPOTLIGHT 1l/ha + DIFFUZ 0.5 l/ha + PHYDEAL 0.25%**



Champ PdT secteur Gouy-sous-Bellonne le 18/08

NOS OFFRES À POURVOIR

Logisticien - F/H - CDD - Gouy-Sous-Bellonne

Responsable de dépôt - H/F - CDI - Nomain

Agent de maintenance - F/H - CDI - Gouy-Sous-Bellonne

Assistant administratif service QHSE - F/H - CDI - Gouy-sous-Bellonne

Vous souhaitez nous rejoindre mais aucune offre ne correspond pas à votre profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature spontanée : <https://jobs.world.luccasoftware.com/groupe-carre/candidature-spontanee-d2e5867f-c127-4c1f-a928-fab5e6675609>

Pour consulter l'ensemble de nos offres d'emploi, *cliquez ici.*
N'hésitez pas à en parler autour de vous !