

LA MÉTÉO DES CULTURES

L'ACTU **EN PLAINE**
DU 12/10/2026



**LA FERME
PILOTE**
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

Sommaire

Edito : La (vraie) pluie aurait-elle pris des congés sans solde ?.....	p 2
La minute biologie végétale.....	p 3
Colza.....	p 5
Semis céréales d'automne.....	p 8
Lin d'hiver.....	p10
Nos offres à pourvoir.....	p11



Cliquez sur les
parties du
sommaire
pour atteindre
celles qui vous
intéressent

L'édito

La (vraie) pluie aurait-elle pris des congés sans solde ?

On a connu les automnes où l'on cherchait désespérément une fenêtre pour semer, les hivers où les bottes restaient collées dans les champs et les printemps où l'on guettait le moindre rayon de soleil pour sortir le pulvérisateur. Cette année, changement de programme : on cherche la pluie ! Et pas les 2 ou 3 mm qui mouillent les feuilles et font juste plaisir au pluviomètre, mais une vraie pluie, capable de réhumecter les sols, de reconstituer un peu de réserve utile et tant qu'à faire de faire fonctionner les herbicides.

Il faut dire que les chiffres commencent à donner le vertige. À l'échelle nationale, septembre affiche un déficit de précipitations proche de 70 %, ce qui en fait le troisième mois de septembre le plus sec depuis 1958. Sur le littoral de la Manche, certains secteurs n'ont reçu qu'environ 20 mm contre 60 à 70 mm habituellement. Et comme si cela ne suffisait pas, les températures ont dépassé les normales de 3,1 °C en moyenne sur le mois. De quoi prolonger sérieusement la consommation en eau des sols !


Le plus inquiétant, c'est que septembre n'est pas un accident isolé. Avril avait déjà enregistré un déficit de pluie de 60 %, juin de 50 % et juillet de 60 %. Depuis mars, aucun mois n'a été excédentaire à l'échelle de la France. Et sous nos pieds, le constat n'est guère plus réjouissant : 66 % des points de suivi des nappes phréatiques se situent sous les normales au 1er octobre, contre 31 % à la même période l'an dernier. Autant dire que la recharge automnale a du pain sur la planche ! Mais pour ça, on a encore le temps.

L'actualité du moment, ce sont les semis d'automne. Et le retour des pluies de la semaine passée n'est vraiment pas homogène avec un gradient Sud/Nord qui va du simple au triple, comme présenté sur notre carte Weenat.

Pour les prochaines semaines, il faudra donc composer avec cette humidité devenue précieuse : soigner les implantations, surveiller les levées, raisonner les interventions et rester vigilant sur l'efficacité des herbicides racinaires, particulièrement dépendante de l'humidité du sol.

Quelques pluies seraient évidemment les bienvenues. Mais pour les orges et surtout les lins d'hiver, il va vraiment falloir y aller si la structure des sols le permet.

Décidément, le problème avec la météo, ce n'est pas qu'elle soit humide ou sèche... Comme le dit l'adage, le mauvais temps c'est le même temps qui dure trop longtemps !




LA MINUTE BIOLOGIE VÉGÉTALE

Désherbage, entre efficacité et sélectivité, faire les bons choix

Une année ne faisant pas l'autre, si pour le moment on se demande comment avoir de l'efficacité, parfois, on hésite plutôt car l'excès d'eau peut favoriser les problèmes de phytotoxicité.

Nous vous avons condensé ci-dessous des valeurs moyennes pluriannuelles de nos essais herbicides sur une base de type « **SPOW 2 l/ha + CODIX 2 l/ha repris FOSBURI 0.6 l/ha** »:



Même en mauvais conditions, une intervention sur semis permet une efficacité moyenne de 60% - c'est toujours 60% de plus qu'une impasse mais surtout, une impasse permettra au mieux un contrôle à hauteur de 70% en venant à 1 feuille : si sur les parcelles propres, ça passe, sur les parcelles sales ce sera intolérable d'autant qu'on dispose de peu d'armes : manque d'efficacité des sulfos ou fops (et impossibilité en Orge mise à part le fenoxaprop), pas de prosulfocarbe en post à cause du risque de phyto sur Orge....bref, encore plus en Orge qu'en blé, les interventions sur semis sont capitales !

Un seul adage à retenir : « TAPER FORT, TAPER TÔT »


Bien entendu toutes les molécules ne sont pas aussi sensibles aux conditions météo lors de l'application : si la PENDIMETHALINE ou le FLUFENACET sont sensibles aux conditions sèches, l'ACLONIFEN ou le DIFLUFENICANIL sont beaucoup moins capricieux

Côté sélectivité, allez, on vous livre en avant-première une synthèse de notre essai de COUTURELLES qui sortira dans le book des essais courant novembre :

LA MINUTE BIOLOGIE VÉGÉTALE (SUITE)

Herbicide Blé 2026	Stade d'application : PRE LEVEE									Stade d'application 1F						Stade d'application SH			PHYTOTOXICITE AU 18 NOVEMBRE			EFFICACITE GLOBALE			
	17/10/2025									Profondeur ==> 4-5 cm : 06/11/2025 // 1 cm : 18/11/2025						17/02/2026									
N° de modalité	PRODUIT 1			PRODUIT 2			PRODUIT 3			PRODUIT 1			PRODUIT 2			PRODUIT 1			1-2cm	3-4 cm	3-4 cm				
	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition							
0	TNT																		Pré	Pré	Pré+Post	Pré	Pré + Post	ré + post + SH	
1	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CODIX	2,5	Pendiméthaline 400g/l + Diflufenican 40g/l				FOSBURI	0,6	Diflufenican 200 g/l + Flufenacet 400 g/l	PUMA LS	0,5	Hincaprop-p-éthyl 63 g/l + méfenpyr-diéthyl 18,75 g/l	ELEDURA	3	Prosulfocarbe 667 g/l + Diflufenicanil 14 g/l + Arylex 1,33 g/l	3,5	0	1	90	95	98	
2	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CODIX	2,5	Pendiméthaline 400g/l + Diflufenican 40g/l				FOSBURI	0,6	Diflufenican 200 g/l + Flufenacet 400 g/l	DATAMAR	1,6	Prosulfocarbe 800g/l + Clodinafop 18 g/l	MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	3,5	0	3,5	90	100	100	
3	ROXY 800	3	Prosulfocarbe 800g/l	DIFLANIL 500	0,2	Diflufenican 500g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufenican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	0	0	1	40	90	100	
4	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Acionifen 600 g/l							SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufenican 25g/l	MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	3,5	0	10	98	99	100	
5	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Acionifen 600 g/l	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufenican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	5	0	2	98	98	100	
6	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Acionifen 600 g/l	CODIX	2	Pendiméthaline 400g/l + Diflufenican 40g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufenican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	10	0	3,5	95	100	100	
7	KUNTAO	0,6	Acionifen 475 g/l + Diflufenicanil 105 g/l	CODIX	2	Pendiméthaline 400g/l + Diflufenican 40g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufenican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	10	0	2	98	100	100	
10	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Acionifen 600 g/l							LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	7,5	0	2	85	100	100	
11	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Acionifen 600 g/l	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	7,5	0	2	80	100	100	
12	KUNTAO	0,6	Acionifen 475 g/l + Diflufenicanil 105 g/l	PSC 14	3	Prosulfocarbe 800g/l + Diflufenicanil 14 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	5	0	2	90	100	100	
13	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CODIX	2	Pendiméthaline 400g/l + Diflufenican 40g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	6	0	2	90	100	100	
14	CELTIC	2,5	Picolinafène 16 g/l + pendiméthaline 320 g/l	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	3,5	0	2	90	100	100	
15	DEFI	3	Prosulfocarbe 800 g/l	PROFI CTU	3	Chlortoluron 500 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	1	0	2	30	100	100	
16	BOZENO	1,35	Acionifene 600g/l	DEFI	3	Prosulfocarbe 800 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	1	0	2	60	100	100	
17	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Acionifen 600 g/l	CELTIC	2,5	Picolinafène 16 g/l + pendiméthaline 320 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	12,5	0	2	98	100	100	
18	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Acionifen 600 g/l	CELTIC	2,5	Picolinafène 16 g/l + pendiméthaline 320 g/l	MYSA	1	AA + Prot	LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l	MYSA	1	AA + Prot	MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75 + MYSA 1	10	0	5	98	100	100	
19	TNT																								

INCIDENCE DU DESHERBAGE SUR LE TALLAGE



Cliquez ici pour
agrandir le tableau



- Les points essentiels de cet essai en pression de vulpins assez élevée :
- Un démarrage trop light (modalité 3) n'est jamais compensé
 - La sélectivité n'est un problème qu'en semis superficiel où des grains restent au sol
 - L'acilonifène présente de vrais risques de sélectivité, mais c'est surtout le cumul de molécules qui détermine ce risque
 - En cas de programme light ou de risque phyto léger (absence de pluie par exemple), rien ne sert de semer profond
 - Si la pré-levée a été agressive, mieux vaut espacer un peu le retour à 2-3 feuilles, surtout en orge
 - Ici comme en pluri-annuel, l'emploi de MYSA permet de diminuer la phytotoxicité





COLZA

Ça ne respire toujours pas la joie pour la plupart de nos colzas, mais malgré tout, « c'est moins pire ». On voit toujours nos 2 situations très tranchées: les semis d'avant le retour des pluies du 20 août, où tout va bien, et les semis de septembre, où tout va toujours mal.



Colza semé le 25/08 - photo prise à Gouy-sous-Bellonne (62) le 12/10



DESHERBAGE

Les désherbages ayant mal fonctionné, de nombreux rattrapages vont être nécessaires pour cibler les dicots passées à travers :

Toutes dicots simples: **BELKAR 0.25 à 0.5 l/ha** après le stade 4-6 feuilles du colza

Matricaires, Laiterons: **LADIVA 0.25 l/ha**

En graminées, sans pour autant être catastrophique, il reste des graminées à gérer et il faut avoir en tête qu'il va encore se passer 1 mois avant les premiers créneaux pour appliquer la propyzamide. Sur les parcelles à population relativement sensible, un **NOROIT 1 l/ha + DIFFUZ 0.5 l/ha + PHYDEAL 0.25%** suffira tandis que sur les populations plus résistantes, une double dim de type **NOROIT 1 l/ha + DEVIN 1 à 2 l/ha** + adjuvant sera nécessaire



RAVAGEURS

La pression est toujours colossale en Altises et Pucerons, avec des Colzas qui parfois perdent en biomasse chaque jour. Pour plagier un de nos technicos, on pourrait dire que certaines parcelles « dépoussent »

Dans la plupart des situations, nous ne sommes pas forcément en situation de "résistance super KDR": un **UPPERCUT 0.2 l/ha + ACTEON 0.05%**, éventuellement renforcé par un **KUSTI 0.05 l/ha**

Pour rappel, une nouvelle dérogation est sortie, permettant de passer un **MINECTO GOLD 0.1 kg/ha** sur les altises adultes et elle permet de répondre à la fois aux impasses réglementaires (limitation à 2 passages d'Etufenprox par exemple), au manque de rémanence des pyréthrinoides et aux résistances SuperKDR généralisées

COLZA (SUITE)

Les pucerons sont toujours à surveiller bien entendu sur les variétés sensibles TuYv comme HELYPSE ou BESSITO, mais avec des concentrations assez vertigineuses dans certaines parcelles, toutes les variétés tolérantes pourront être protégées en cas de stress trop conséquent. Si plus de 20% des pieds sont porteurs, intervenir avec **TEPPEKI 100 g/ha**



REGULATION

Hé oui qui l'eût cru, des parcelles sont tout de même à réguler contre l'élongation automnale, même cette année!

A n'utiliser que sur les sensibles élongation (la plupart des Colzas éruciques, HELYPSE...) ayant bénéficié de forts apports d'organiques et/ ou d'engrais starter avec un peuplement très dense, avec par ordre d'efficacité:

CARYX 0.7 à 0.8

METCO 75g à 90g

TEBUKO 150 à 200 g

NUTRITION

Sur les parcelles carencées en Bore (teneur faible et/ou pH alcalin), un apport de 200 g, par exemple avec **BRASSIFLOW 2l/ha** dès l'automne pourra être bénéfique au pivot, plutôt que d'attendre la sortie d'hiver

SOUTIEN A LA CROISSANCE

Sur des parcelles qui patinent, soit parce qu'il n'y a pas eu de starter, soit parce que l'état hydrique du sol ne permet pas un bon fonctionnement des engrais, on peut choisir la voir foliaire avec **ACRECIO 5 l/ha**

ET SI ON DOIT RETOURNER ?

Globalement, la plupart des herbicides permettent l'installation d'un Blé moyennant un bon labour et/ou un délai (cf Tableau Terres Inovia). C'est la napropamide à pleine dose qui pose le plus de problèmes de sélectivité pour les céréales

COLZA (SUITE)

Remplacement de la culture après retournement du colza

Herbicides sur colza	Blé (tendre et dur)	Pois d'hiver	Féverole d'hiver	Orge de printemps	Maïs	Tournesol	Soja	Betterave	Pois de printemps	Féverole de printemps	Lin graine de printemps	Sorgho	Ray-grass	Moutarde	Chanvre	Colza de printemps	Pomme de terre	Lentille
napropamide																		
ALABAMA	120j			120j														.
AXTER																		.
BRANDO		60j	60j												.			.
BRANDO 1,25 l/ha + TEROX 1,25 l/ha	(7)	60j	60j												.			.
BUTISAN S/SULTAN/RAPSAN 500 SC															.			
CALLISTO	-			-				-			-	-	-	-	-	-	-	-
CENT 7		-	-					-		-		-	-	-	-		-	
COLZOR TRIO 4 l/ha															-			.
COLZOR TRIO 2,5 l/ha															-			.
COLZOR UNO															-			.
IELO					120j (5)	150j		120j				120j (5)	210j	90j	-	90j		
FOX													-	-	-			.
LADIVA	30j			30j	30j	150j		120j			-	30j	30j	30j	-			
LONTREL 100 ou SG	-						120j								-		120j	
MOZZAR/BELKAR	30j			30j	30j	(6)		(6)			(6)	30j	30j		-			
NERO + métazachlore								(2)	(2)	-	-	-	-	-	-		-	.
NERO			-	(2)				(2)		-	-	-	(2)	-	-			
BODY, CIRCUIT, métazachlore + clomazone															-			.
NOVALL/BANDONEON																		.
RAPSAN TDI + CENTIUM 36 S	120j			120j						120j		-	-	-	-			.
SPRINGBOK	140j	(3)	(3)	140j					(3)	(3)	-			-				
TANARIS/SOLANIS																		.
TRIVALDI	120j			120j	120j	180j		150j			120j	120j	120j	120j	-	120j		
propyzamide (KERB FLO, etc.)					120j (5)			120j				120j (5)	210j		120- 150j		30j	
Anti-graminées foliaires (AGIL, FUSILADE MAX, etc.)																		

Culture possible sans restriction (quel que soit le travail du sol préalable)

Culture possible à condition de faire un labour profond

Culture déconseillée

Parfois risque de feignage après un labour. Ce risque, peu fréquent est grave après un automne ou un hiver sec. Ce risque peut être encouru si les avantages économiques du remplacement s'avèrent insuffisants.

Pas d'information suffisante ou cas peu probable

Mélanges et/ou programmes : dans ce cas, raisonnez par rapport à l'herbicide le plus restrictif.

(1) Blé tendre et blé dur de printemps.

(2) Avec un travail du sol sur au moins 10 cm.

(3) Cultures non destinées à l'alimentation humaine.

(4) Pour tournesol Clearfield et ExpressSun, culture possible sans labour.

(5) Maïs et sorgho : 90 jours pour une implantation avec labour.

(6) Tournesol et betterave : 120 jours pour la dose de 0,25 l/ha et 150 jours pour la dose de 0,5 l/ha. Lin : 90 jours à la dose de 0,25 l et 120 jours à la dose de 0,5 l.

(7) Blé tendre et blé dur d'hiver uniquement. Attendre 60 jours. Déconseillé sur blé de printemps.

Sources : firmes

Mise à jour : juillet 2025

SEMIS DES CÉRÉALES D'AUTOMNE

Si sur une partie de la région le retour d'eau a été significatif. Au sud et notamment dans les zones de production d'Orge (Plateau Picard sud par exemple), la situation est beaucoup plus timorée. Malgré tout, on ne va pas pouvoir attendre la Saint Glinglin pour semer, car d'après les prédictions météo, il ne faut rien espérer d'ici au 25/10 (cf carte ci-dessous)




prévision probabiliste du cumul des précipitations

mise-à-jour : 11/10/2026


Choisissez un seuil de cumul de précipitation pour la période :

Choisissez la semaine à afficher :

probabilité somme précipitation $\geq 10\text{mm}$ sur la semaine 2
période: 2026-10-19 - 2026-10-25



probabilité



source : ECMWF du 2026-10-11

visualisation : Acta - instituts techniques agricoles / Météo-France



SEMIS DES CÉRÉALES D'AUTOMNE

Il faut dans tous les cas avoir en tête que sur les parcelles à graminées, la dernière chose à faire serait de faire une impasse sur le semis car alors, la situation sera réellement incontrôlable. (cf minute biologie végétale)

L'usage du Prosulfocarbe est strictement encadré. SYNGENTA a développé un outil que vous pouvez utiliser pour vérifier que les contraintes de distances avec des cultures non cibles non récoltées sont respectées :



[Quali'Cible | Produits](#)



RAVAGEURS : surveiller les pucerons !

Si jamais le semis devait être retardé, il conviendra de monter un peu la densité de semis. Également, avec les températures annoncées, la levée sera très rapide et les pucerons toujours présents : prévoir dès le stade 1 feuille une protection de type **SPLIT EXPERT 0.05 l/ha + ACTEON 0.05%**



LIN D'HIVER

Les premières implantations ont eu lieu tandis que les semis vont se poursuivre avec finalement, peu d'avance voire du retard sur les dates optimales.

Niveau d'és herbage voici pour rappel les principales solutions possibles:

CALLIPRIME X'TRA 0.3 I/ha (mésotrione): la solution passe-partout, spectre plutôt anti-dicots

COLZAMID 1.5 à 2 I/ha (napropamide): ciblée très Coquelicots et Vulpins, cette solution présente l'inconvénient d'être très dépendante des conditions météo. A ne surtout pas incorporer!

ATIC AQUA 1.5I/ha (pendiméthaline): mêmes cibles ou presque que la Napro, et même sensibilité à la sécheresse MAIS on peut venir en post-levée avec cette solution sans soucis de sélectivité et en ajustant en fonction des conditions météo.

On peut donc désormais fonctionner en programmes, avec par exemple:

CALLIPRIME X'TRA 0.3 I/ha repris par **ATIC AQUA 1.5 I/ha** sur un lin levé et un sol humide afin d'avoir un contrôle total sans risque de sélectivité



NOS OFFRES À POURVOIR

Agent de maintenance - F/H - CDI - Gouy-Sous-Bellonne

Gestionnaire approvisionnement - F/H - CDI - Gouy-sous-Bellonne

Exploitant Transport - F/H - CDD - Gouy-sous-Bellonne

Vous souhaitez nous rejoindre mais aucune offre ne correspond pas à votre profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature spontanée : <https://jobs.world.luccasoftware.com/groupe-carre/candidature-spontanee-d2e5867f-c127-4c1f-a928-fab5e6675609>

Pour consulter l'ensemble de nos offres d'emploi, *cliquez ici*.
N'hésitez pas à en parler autour de vous !