

LA MÉTÉO DES CULTURES

L'ACTU **EN PLAINE**
DU 26/10/2026



**LA FERME
PILOTE**
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

Sommaire

Edito : Des conditions optimales pour les derniers semis d'Octobre.....	p 2
La minute biologie végétale.....	p 3
Colza.....	p 5
Semis céréales d'automne.....	p 8
Lin d'hiver.....	p 9
Nos offres à pourvoir.....	p11



Cliquez sur les
parties du
sommaire
pour atteindre
celles qui vous
intéressent


L'édito

Des conditions optimales pour les derniers semis d'Octobre ?

Cette fois-ci, on l'a eue ! D'abord avec AUSTEN, puis avec BOELO, la pluie est revenue sur la région avec comme à chaque fois un gradient Nord/ Sud marqué, mais avec 30 à 80 mm, on peut dire qu'on n'aura plus à s'inquiéter des conditions de travail du sol. On en aurait peut-être même trop sur le Calaisis/ Boulonnais, mais enfin, on fera avec.

Pour les 10 prochains jours, les températures ne descendront pas sous les 12°C : dans ces conditions, tout poussera : Orges, Blés, Colzas mais aussi Vulpins et Ray Grass. Et tout volera : Pucerons, Charançons seront sans aucun doute de la partie

Cette semaine, on aura donc de la surveillance à faire en parcelles, et des interventions diverses et variées : rattrapages herbicides, insecticides... sur des cultures diversifiées (Lins, Céréales, Colzas...) : attention aux rinçages de pulvérisateur !



LA MINUTE BIOLOGIE VÉGÉTALE


Il y a-t-il de gros risques de phyto sur les semis à venir?

Désormais la question n'est plus de savoir si on aura de l'eau, mais si on aura de la phyto avec le retour de conditions de sols plus humides.

Côté sélectivité, allez, on vous livre en avant première une synthèse de notre essai à Couturelle qui sortira dans le book des essais courant Novembre :

Herbicide Blé 2026	Stade d'application : PRE LEVEE									Stade d'application 1F						Stade d'application SH			PHYTOTOXICITE AU 18 NOVEMBRE			EFFICACITE GLOBALE		
	17/10/2025									Profondeur => 4-5 cm : 06/11/2025 // 1 cm : 18/11/2025						17/02/2026						21/05/2026		
N° de modalité	PRODUIT 1			PRODUIT 2			PRODUIT 3			PRODUIT 1			PRODUIT 2			PRODUIT 1								
	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	1-2cm	3-4 cm	3-4 cm	Pré	Pré + Post	Pré + post
0	TNT																							
1	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CODIX	2,5	Pendiméthaline 400g/l + Diflufenican 40g/l				FOSBURI	0,6	Diflufenican 200 g/l + Flufenacet 400 g/l	PUMA LS	0,5	fénoxaprop-p-éthyl 63 g/l + méfenop-dithyl 18,75 g/l	ELEDURA	3	Prosulfocarbe 667 g/l + Diflufenicanil 14 g/l + Arylex 1,33 g/l	3,5	0	1	90	95	98
2	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CODIX	2,5	Pendiméthaline 400g/l + Diflufenican 40g/l				FOSBURI	0,6	Diflufenican 200 g/l + Flufenacet 400 g/l	DATAMAR	1,6	Prosulfocarbe 800g/l + Clodinafop 10 g/l	MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	3,5	0	3,5	90	100	100
3	ROXY 800	3	Prosulfocarbe 800g/l	DIFLANIL 500	0,2	Diflufenican 500g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufenican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	0	0	1	40	90	100
4	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Aclonifen 600 g/l							SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufenican 25g/l	MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	3,5	0	10	98	99	100
5	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Aclonifen 600 g/l	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufenican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	5	0	2	98	98	100
6	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Aclonifen 600 g/l	CODIX	2	Pendiméthaline 400g/l + Diflufenican 40g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufenican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	10	0	3,5	95	100	100
7	KUNTAO	0,6	Aclonifen 475 g/l + Diflufenicanil 105 g/l	CODIX	2	Pendiméthaline 400g/l + Diflufenican 40g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufenican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	10	0	2	98	100	100
10	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Aclonifen 600 g/l							LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	7,5	0	2	85	100	100
11	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Aclonifen 600 g/l	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	7,5	0	2	80	100	100
12	KUNTAO	0,6	Aclonifen 475 g/l + Diflufenicanil 105 g/l	PSC 14	3	Prosulfocarbe 800g/l + Diflufenicanil 14 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	5	0	2	90	100	100
13	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CODIX	2	Pendiméthaline 400g/l + Diflufenican 40g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	6	0	2	90	100	100
14	CELTIC	2,5	Picolinafène 15 g/l + pendiméthaline 320 g/l	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	3,5	0	2	90	100	100
15	DEFI	3	Prosulfocarbe 800 g/l	PROFI CTU	3	Chlortoluron 500 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	1	0	2	30	100	100
16	BOZENO	1,35	Aclonifene 600g/l	DEFI	3	Prosulfocarbe 800 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	1	0	2	60	100	100
17	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Aclonifen 600 g/l	CELTIC	2,5	Picolinafène 15 g/l + pendiméthaline 320 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	12,5	0	2	98	100	100
18	MATENO DUO	1,2	Diflufenican 120g/l + Aclonifen 600 g/l	CELTIC	2,5	Picolinafène 15 g/l + pendiméthaline 320 g/l	MYSA	1	AA + Prot	LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l	MYSA	1	AA + Prot	MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75 + MYSA 1	10	0	5	98	100	100
19	TNT																							

INCIDENCE DU DESHERBAGE SUR LE TALLAGE



Cliquez ici pour
agrandir le tableau




Les points essentiels de cet essai en pression Vulpins assez élevée :

- Un démarrage trop light (modalité 3) n'est jamais compensé
- La sélectivité n'est un problème qu'en semis superficiel où des grains restent au sol
- L'Aclonifen présente de vrais risques de sélectivité, mais c'est surtout le cumul de molécules qui détermine ce risque
- En cas de programme light ou de risque phyto léger (absence de pluie par exemple), rien ne sert de semer profond
- Si la pré-levée a été agressive, mieux vaut espacer un peu le retour à 2/3 feuilles, surtout en Orge
- Ici comme en pluri-annuel, l'emploi de **MYSA** permet de diminuer la phytotoxicité

LA MINUTE BIOLOGIE VÉGÉTALE (SUITE)

Et pour rappel niveau efficacité, nous vous avons condensé ci-dessous des valeurs moyennes pluriannuelles de nos essais herbicides sur une base de type **SPOW 2 l/ha + CODIX 2 l/ha** repris **FOSBURI 0.6 l/ha** :



Même en mauvaises conditions, **une intervention sur semis permet une efficacité moyenne de 60%**, c'est toujours 60% de plus qu'une impasse mais surtout, une impasse permettra au mieux un contrôle à hauteur de 70% en venant à 1 feuille : si sur les parcelles propres, ça passe, sur les parcelles sales ce sera intolérable d'autant qu'on dispose de peu d'armes: manque d'efficacité des sulfos ou fops par exemple

Un seul adage à retenir : « **TAPER FORT, TAPER TOT** »

Désormais, on aura moins de problèmes d'efficacité grâce à la bonne réhumectation des sols, et il faudra même se méfier, Novembre arrivant, de phytotoxicités avec la Pendiméthaline ou l'Aclonifen si de fortes précipitations revenaient.



COLZA

Step by step : si ça ne respire toujours pas la joie pour la plupart de nos Colzas, « c'est de moins pire en moins pire ». On voit toujours nos 2 situations très tranchées : les semis d'avant le retour des pluies du 20 Août, où tout va bien, et les semis de Septembre, où tout va toujours assez mal.



Colza semé le 25/08 - photo prise à Gouy-sous-Bellonne (62) le 26/10

Certains sont à peine au stade cotylédon : rarement on aura vu tel décalage entre semis et germination !

Les seuils de retournement sont aux alentours de 7 à 9 plantes / m² en fonction du peuplement et de l'état des plantes restantes : ne pas se hâter à retourner une parcelle « moche, mais bien réfléchir avec l'application des Propyzamides car ensuite, on sera assez retreints en terme de culture de remplacement (voir plus bas)

Pour être viable, on vise un stade 4 feuilles avant les premières gelées : ça devrait être jouable sur la plupart des situations qui nous interrogent actuellement



DESHÉBAGE

Il n'a toujours pas gelé, même si une vague gelée blanche a été constatée la semaine dernière : les applications de Mésotrione (**CALLISTO 0.15 l/ha**) sur crucifères restent trop peu sélectives pour le moment

Ne surtout pas attaquer les propyzamides (**KERB, IELO**) : les sols sont encore bien trop chauds pour une efficacité optimale !!

Sur certaines parcelles avec un risque d'élongation marqué (trop forte biomasse, variété sensible...), éviter toute application de Cléthodime qui pourrait être toxique pour la plante.

COLZA

RAVAGEURS

On voit moins d'Altises adultes et de Pucerons, mais ce sont désormais les larves d'Altises qu'il faut gérer

Il faut désormais déclencher les interventions : en l'absence de suivi avec des cuvettes jaunes pour repérer l'arrivée des adultes en septembre, seul le modèle Terres Inovia permet la prédiction des bons stades larvaires « baladeurs »

Un **UPPERCUT 0.2 l/ha + ACTEON 0.05%**, éventuellement renforcé par un **KUSTI 0.05 l/ha** fera l'affaire pour une première intervention : mieux vaut garder la précieuse cartouche **MINECTO GOLD 0.1 kg/ha + ACTIROB 1 l/ha** pour nettoyer les Colzas vers le 10/11. En effet, on a souvent tendance à l'utiliser beaucoup trop tôt et à louper ainsi un bon nombre de larves qui commettront des dégâts plus tard

👉 **Article Terres Inovia : [Larves d'altises, quand positionner la solution Minecto Gold ?](#)**

Charançon du Bourgeon Terminal :


Les premières captures ont eu lieu en parcelle la semaine dernière et après l'intermède tempétueux du weekend dernier, il y a fort à parier que le retour d'un temps doux et calme va favoriser de nouveaux vols. Attention, ne pas se précipiter: il ne faut intervenir que 8 à 10 jours après les premières captures, afin de cibler un maximum de femelles matures, juste avant leur ponte. L'ensemble des solutions Altises sera efficace sur les CBT (Charançon du Bourgeon Terminal)

NUTRITION

Sur les parcelles carencées en Bore (teneur faible et/ou pH alcalin), un apport de 200 g, par exemple avec **BRASSIFLOW 2l/ha** dès l'automne pourra être bénéfique au pivot, plutôt que d'attendre la sortie d'hiver

ET SI ON DOIT RETOURNER?

Globalement, la plupart des herbicides permettent l'installation d'un Blé moyennant un bon labour et/ou un délai (cf Tableau Terres Inovia). C'est la Napropamide à pleine dose qui pose le plus de problème de sélectivité pour les céréales



COLZA

Remplacement de la culture après retournement du colza

Herbicides sur colza	Blé (tendre et dur)	Pois d'hiver	Féverole d'hiver	Orge de printemps	Maïs	Tournesol	Soja	Betterave	Pois de printemps	Féverole de printemps	Lin graine de printemps	Sorgho	Ray-grass	Moutarde	Chanvre	Colza de printemps	Pomme de terre	Lentille
napropamide																		
ALABAMA	120j			120j														.
AXTER																		.
BRANDO		60j	60j												.			.
BRANDO 1,25 l/ha + TEROX 1,25 l/ha	(7)	60j	60j												.			.
BUTISAN S/SULTAN/RAPSAN 500 SC															.			
CALLISTO	-			-				-			-	-	-	-	-	-	-	-
CENT 7		-	-					-		-		-	-	-	-		-	
COLZOR TRIO 4 l/ha															-			.
COLZOR TRIO 2,5 l/ha															-			.
COLZOR UNO															-			.
IELO					120j (5)	150j		120j				120j (5)	210j	90j	-	90j		
FOX													-	-	-			.
LADIVA	30j			30j	30j	150j		120j			-	30j	30j	30j	-			
LONTREL 100 ou SG	-						120j								-		120j	
MOZZAR/BELKAR	30j			30j	30j	(6)		(6)			(6)	30j	30j		-			
NERO + métazachlore								(2)	(2)	-	-	-	-	-	-		-	.
NERO			-	(2)				(2)		-	-	-	(2)	-	-			
BODY, CIRCUIT, métazachlore + clomazone															-			.
NOVALL/BANDONEON																		.
RAPSAN TDI + CENTIUM 36 S	120j			120j						120j		-	-	-	-			.
SPRINGBOK	140j	(3)	(3)	140j					(3)	(3)	-			-				
TANARIS/SOLANIS																		.
TRIVALDI	120j			120j	120j	180j		150j			120j	120j	120j	120j	-	120j		
propyzamide (KERB FLO, etc.)					120j (5)			120j				120j (5)	210j		120- 150j		30j	
Anti-graminées foliaires (AGIL, FUSILADE MAX, etc.)																		

Culture possible sans restriction (quel que soit le travail du sol préalable)
 Culture possible à condition de faire un labour profond
 Culture déconseillée
 Parfois risque de feignage après un labour. Ce risque, peu fréquent est grave après un automne ou un hiver sec. Ce risque peut être encouru si les avantages économiques du remplacement s'avèrent insuffisants.

Pas d'information suffisante ou cas peu probable

Mélanges et/ou programmes : dans ce cas, raisonnez par rapport à l'herbicide le plus restrictif.

(1) Blé tendre et blé dur de printemps.
(2) Avec un travail du sol sur au moins 10 cm.
(3) Cultures non destinées à l'alimentation humaine.
(4) Pour tournesol Clearfield et ExpressSun, culture possible sans labour.
(5) Maïs et sorgho : 90 jours pour une implantation avec labour.
(6) Tournesol et betterave : 120 jours pour la dose de 0,25 l/ha et 150 jours pour la dose de 0,5 l/ha. Lin : 90 jours à la dose de 0,25 l et 120 jours à la dose de 0,5 l.
(7) Blé tendre et blé dur d'hiver uniquement. Attendre 60 jours. Déconseillé sur blé de printemps.

Sources : firmes

Mise à jour : juillet 2025

SEMIS DES CÉRÉALES D'AUTOMNE

Ça y est, on a réussi à dépoter un grand nombre de parcelles ! et désormais, on peut s'estimer hors de danger de tout risque de mauvaise levée.

Néanmoins, certaines parcelles n'ont pas été désherbées sur le semis : il va impérativement falloir intervenir le plus rapidement possible dès le stade rayonnant, en ayant en tête **qu'entre une application sur semis et une application à 1 feuille, on perd entre 10 et 20% d'efficacité**

Il faut avoir en tête également que nous avons eu très peu de levées printanières de graminées, quasiment aucune estivale et qu'à un moment donné, va bien falloir que ça lève !

Et le fameux « levier agronomique du semis après le 25 Octobre » me direz-vous ? ça marchait, du temps où le 25 Octobre ne présentait pas une météo du 25 Septembre ...

L'usage du Prosulfocarbe est strictement encadré. SYNGENTA a développé un outil que vous pouvez utiliser pour vérifier que les contraintes de distances avec des cultures non cibles non récoltées sont respectées :




[Quali'Cible | Produits](#)



RAVAGEURS: surveillez les pucerons !!

Avec les températures annoncées, la levée devrait être très rapide et les pucerons toujours présents : prévoir dès le stade 1 feuille une protection de type **SPLIT EXPERT 0.05 l/ha + ACTEON 0.05%**

Figure 1 : Relation entre températures et activité des pucerons





LIN D'HIVER

Le retour d'une bonne humectation des sols risque de relancer des germinations de graminées. En cas de nécessité de rattrapage, désormais, la pendiméthaline (**ATIC AQUA**) est homologuée, avec de très bonnes sélectivités, à **1.5 l/ha** à retrouver dans notre essai de 2026.

Les températures favorables de la semaine à venir devraient leur faire rattraper le relatif retard pris sur les autres années, nous aurons l'occasion de reparler régulation d'ici là.



NOS OFFRES À POURVOIR

Agent de maintenance - F/H - CDI - Gouy-Sous-Bellonne

Exploitant Transport - F/H - CDD - Gouy-sous-Bellonne

Gestionnaire Trésorerie H/F - CDI - Gouy-sous-Bellonne

Gestionnaire Facturation H/F - CDI - Gouy-sous-Bellonne

Technico-commercial H/F - CDI - secteur Saint-Amand-les-Eaux

Vous souhaitez nous rejoindre mais aucune offre ne correspond pas à votre profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature spontanée : <https://jobs.world.luccasoftware.com/groupe-carre/candidature-spontanee-d2e5867f-c127-4c1f-a928-fab5e6675609>

Pour consulter l'ensemble de nos offres d'emploi, *cliquez ici*.
N'hésitez pas à en parler autour de vous !