

LA MÉTÉO DES CULTURES

L'ACTU EN PLAINE DU 09/11/2026

LA FERME PILOTE
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

Sommaire

Edito : Ça va plutôt pas mal en plaine ..... p 2
La minute biologie végétale ..... p 3
Colza ..... p 5
Semis céréales d'automne ..... p 8
Lin d'hiver ..... p 10
Nos offres à pourvoir ..... p 11

Cliquez sur les parties du sommaire pour atteindre celles qui vous intéressent



LA FERME PILOTE
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

L'ACTU EN PLAINE
DU 09/11/2026

L'édito

Ça va plutôt pas mal en plaine !

La semaine du 11 novembre marque traditionnellement une période charnière dans le suivi des parcelles de colza, juste avant leur repos végétatif. Nous arrivons en effet dans une période généralement propice à la gestion des larves de grosses altises avec **MINECTO GOLD**, ainsi qu'aux premières applications de propyzamide.

Les prévisions des dix prochains jours annoncent une alternance de journées fraîches, autour de 5 à 6 °C, et de journées nettement plus douces, voire chaudes pour la saison, à 15-16 °C. Dans ces conditions, il faudra impérativement actualiser nos décisions au fil de l'évolution météorologique et des observations de terrain.

Une chose est sûre : **les sols sont désormais suffisamment frais et humides**, sans épisodes de fortes précipitations annoncés dans l'immédiat. Des conditions plutôt favorables à la bonne implantation des dernières céréales restant à semer, mais également au positionnement des propyzamides, sous réserve du respect des conditions d'emploi.

Préserver cette matière active est un enjeu majeur ! Il est essentiel de limiter au maximum les risques de transfert vers les eaux souterraines et superficielles. Car si nous devions un jour perdre la propyzamide, la gestion des graminées dans les colzas deviendrait autrement plus compliquée… et nous n'avons franchement pas besoin de ce défi supplémentaire !

Du côté des lins d'hiver, la croissance se poursuit tranquillement. Il va désormais falloir commencer à réfléchir aux éventuelles interventions de régulation et de protection fongicide avant l'hiver.
Enfin, sur les orges d'hiver, nous avons observé cette semaine quelques symptômes de phytotoxicité, consécutifs aux fortes précipitations. Rien de particulièrement inquiétant à ce stade, mais des situations qui méritent néanmoins d'être surveillées et parfois qui méritent un coup de pouce.

Bref, la plaine présente actuellement un plutôt beau visage ! Entre interventions à raisonner, cultures à surveiller et météo à décrypter, faisons le tour de ce qui nous attend dans cette nouvelle Météo des Cultures.





LA FERME PILOTE
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

L'ACTU EN PLAINE
DU 09/11/2026


LA MINUTE BIOLOGIE VÉGÉTALE

IL Y A T-IL DE GROS RISQUE PHYTO SUR LES SEMIS À VENIR ?

Plus le temps passe et plus nous risquons d'implanter des blés en conditions plus compliquées, notamment dans les terres argileuses. Tout grain laissé sur le sol risquera fort d'être condamné par le désherbage : il faudra donc semer un peu plus dense en fonction du programme envisagé. Parallèlement, la pression graminées et surtout Vulpins s'estompe petit à petit, on va donc pouvoir baisser un peu la charge sur le désherbage au semis.

Côté sélectivité, allez, on vous livre en avant-première une synthèse de notre essai de COUTURELLES qui sortira dans le book des essais courant Novembre :

Herbicide Blé 2026	Stade d'application : PRE LEVEE									Stade d'application 1F						Stade d'application SH			PHYTOTOXICITE AU 18 NOVEMBRE			EFFICACITE GLOBALE		
	17/10/2025									Profondeur => 4-5 cm : 06/11/2025 // 1 cm : 18/11/2025						17/02/2026						21/05/2026		
N° de modalité	PRODUIT 1			PRODUIT 2			PRODUIT 3			PRODUIT 1			PRODUIT 2			PRODUIT 1			1-2cm	3-4 cm	3-4 cm			
	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Nom	Dose/ha	Composition	Pré	Pré	Pré+Post	Pré	Pré + Post	Pré + post +
0	TNT																							
1	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CODIX	2,5	Pendiméthaline 400g/l + Diflufénican 40g/l				FOSBURI	0,6	Diflufénican 200 g/l + Flufénacet 400 g/l	PUMA LS	0,5	fénoxaprop-p-éthyl 69 g/l + mésenpyr-diéthyl 18,75 g/l	ELEDURA	3	Prosulfocarbe 667 g/l + Diflufénicanil 14 g/l + Arylex 1,33 g/l	3,5	0	1	90	95	98
2	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CODIX	2,5	Pendiméthaline 400g/l + Diflufénican 40g/l				FOSBURI	0,6	Diflufénican 200 g/l + Flufénacet 400 g/l	DATAMAR	1,6	Prosulfocarbe 800g/l + Clodinafop 80 g/l	MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	3,5	0	3,5	90	100	100
3	ROXY 800	3	Prosulfocarbe 800g/l	DIFLANIL 500	0,2	Diflufénican 500g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufénican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	0	0	1	40	90	100
4	MATENO DUO	1,2	Diflufénican 120g/l + Aclonifen 600 g/l							SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufénican 25g/l	MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	3,5	0	10	98	99	100
5	MATENO DUO	1,2	Diflufénican 120g/l + Aclonifen 600 g/l	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufénican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	5	0	2	98	98	100
6	MATENO DUO	1,2	Diflufénican 120g/l + Aclonifen 600 g/l	CODIX	2	Pendiméthaline 400g/l + Diflufénican 40g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufénican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	10	0	3,5	95	100	100
7	KUNTAO	0,6	Aclonifen 475 g/l + Diflufénicanil 105 g/l	CODIX	2	Pendiméthaline 400g/l + Diflufénican 40g/l				CONSTEL	4	Chlortoluron 400 g/l + diflufénican 25g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	10	0	2	98	100	100
10	MATENO DUO	1,2	Diflufénican 120g/l + Aclonifen 600 g/l							LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	7,5	0	2	85	100	100
11	MATENO DUO	1,2	Diflufénican 120g/l + Aclonifen 600 g/l	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	7,5	0	2	80	100	100
12	KUNTAO	0,6	Aclonifen 475 g/l + Diflufénicanil 105 g/l	PSC 14	3	Prosulfocarbe 800g/l + Diflufénicanil 14 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	5	0	2	90	100	100
13	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l	CODIX	2	Pendiméthaline 400g/l + Diflufénican 40g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	6	0	2	90	100	100
14	CELTIC	2,5	Picolinafène 15 g/l + pendiméthaline 320 g/l	SPOW	3	Prosulfocarbe 800g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	3,5	0	2	90	100	100
15	DEFI	3	Prosulfocarbe 800 g/l	PROFI CTU	3	Chlortoluron 500 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	1	0	2	30	100	100
16	BOZENO	1,35	Aclonifene 600g/l	DEFI	3	Prosulfocarbe 800 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	1	0	2	60	100	100
17	MATENO DUO	1,2	Diflufénican 120g/l + Aclonifen 600 g/l	CELTIC	2,5	Picolinafène 15 g/l + pendiméthaline 320 g/l				LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l				MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75	12,5	0	2	98	100	100
18	MATENO DUO	1,2	Diflufénican 120g/l + Aclonifen 600 g/l	CELTIC	2,5	Picolinafène 15 g/l + pendiméthaline 320 g/l	MYSA	1	AA + Prot	LUXI G2	1,25	Cynméthylin 400 g/l + Picolinafène 38 g/l	MYSA	1	AA + Prot	MEDZO 1,5	DYVEL 0,5	VOLCANE DUO 0,75 + MYSA 1	10	0	5	98	100	100
19	TNT																							




Cliquez ici pour agrandir le tableau

Les points essentiels de cet essai en pression **Vulpins assez élevée** :

- Un démarrage trop light (modalité 3) n'est jamais compensé
- La sélectivité n'est un problème qu'en semis superficiel où des grains restent au sol
- L'Aclonifen présente de vrais risques de sélectivité, mais c'est surtout le cumul de molécules qui détermine ce risque
- En cas de programme light ou de risque phyto léger (absence de pluie par exemple), rien ne sert de semer profond
- Si la pré-levée a été agressive, mieux vaut espacer un peu le retour à 2/3 feuilles, surtout en Orge
- Ici comme en pluri-annuel, l'emploi de **MYSA** permet de diminuer la phytotoxicité

LA MINUTE BIOLOGIE VÉGÉTALE (SUITE)

Et pour rappel niveau efficacité, nous vous avons condensé ci-dessous des valeurs moyennes pluriannuelles de nos essais herbicides sur une base de type **SPOW 2 l/ha + CODIX 2 l/ha** repris **FOSBURI 0.6 l/ha** :



Même en mauvaises conditions, **une intervention sur semis permet une efficacité moyenne de 60%,** c'est toujours 60% de plus qu'une impasse mais surtout, une impasse permettra au mieux un contrôle à hauteur de 70% en venant à 1 feuille : si sur les parcelles propres, ça passe, sur les parcelles sales ce sera intolérable d'autant qu'on dispose de peu d'armes: manque d'efficacité des sulfos ou fops par exemple
Un seul adage à retenir : **« TAPER FORT, TAPER TOT »**

Désormais, on aura moins de problèmes d'efficacité grâce à la bonne réhumectation des sols, et il faudra même se méfier, Novembre arrivant, de phytotoxicités avec la Pendiméthaline ou l'Aclonifen si de fortes précipitations revenaient.



LA MÉTÉO DES CULTURES

LA FERME PILOTE
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

L'ACTU EN PLAINE
DU 09/11/2026

COLZA

Step by step toujours : même si nous avons déjà retourné certaines parcelles, ça va quand même mieux chez les colzas. L'objectif de 8 feuilles / 8 mm au collet à l'entrée de l'hiver est atteinte dans la plupart des cas, et le minimum vital de 4 feuilles pour résister aux premières gelées également.

On a observé de nouvelles germinations fin octobre avec des colzas au stade cotylédons : ça fait mal au cœur, mais ils sont sans doute condamnés d'avance



Colza semé le 25/08 - photo prise à Gouy-sous-Bellonne (62) le 09/11

Les seuils de retournement sont aux alentours de 7 à 9 plantes / m2 en fonction du peuplement et de l'état des plantes restantes : ne pas se hâter à retourner une parcelle « moche, mais bien réfléchir avec l'application des Propyzamides car ensuite, on sera assez restreints en termes de culture de remplacement (voir plus bas)
Pour être viable, on vise un stade 4 feuilles avant les premières gelées : ça devrait être jouable sur la plupart des situations qui nous interrogent actuellement.

DESHERBAGE
Il n'a toujours réellement gelé mais dans certaines parcelles il faut gérer Sanves et Ravenelles : les applications de Mésotrione peuvent démarrer
Sanves, Moutarde, Capselles : **CALLISTO 0.15l/ha**
Ravenelles ; Véronique feuille de lierre : **CALLISTO 0,15 l/ha + CENT7 0,2 l/ha**

On peut attaquer tranquillement les propyzamides (**KERB, IELO**) : les sols sont encore enfin suffisamment frais pour une efficacité optimale MAIS ATTENTION AUX JOURNÉES CHAUDES ANNONCÉES DANS QUELQUES JOURS

Ray Grass, Vulpins : **KERB FLO 1,87 l/ha**
Graminées + Matricaires, dicots diverses, plantes compagnes : **BIWIX 1,5 l/ha**

Il est utile de laisser travailler les plantes compagnes le plus longtemps possible : leur démarrage a été retardé par le temps sec. **Il faudra quoi qu'il arrive les détruire, surtout si vous travaillez avec des espèces peu gélives (Féveroles) ou des Trèfles d'Alexandrie multicoupe qui repartiront au printemps.**

Sur certaines parcelles avec un risque d'élongation marqué (trop forte biomasse, variété sensible…), proscrire toute application de Cléthodime qui pourrait être toxique pour la plante.



LA MÉTÉO DES CULTURES

LA FERME PILOTE
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

L'ACTU EN PLAINE
DU 09/11/2026

COLZA


RAVAGEURS

Nous arrivons dans la période idéale pour l'emploi du **MINECTO GOLD (100g/ha + ACTIROB 1 l/ha)**

Seul le modèle Terres Inovia permet la prédiction des bons stades larvaires « baladeurs »
Pensez à réaliser vos tests Berlèse, obligatoires dans le cadre de la dérogation pour l'usage du Minecto Gold

Un **UPPERCUT 0,2 l/ha + ACTEON 0,05 %**, éventuellement renforcé par un **KUSTI 0,05 l/ha** peut aussi faire l'affaire pour une première intervention si vous souhaitez garder la précieuse cartouche **MINECTO GOLD 0,1 kg/ha + ACTIROB 1 l/ha** pour nettoyer les colzas plus tard.





👉 **Article Terres Inovia : *Larves d'altises, quand positonner la solution Minecto Gold ?***

NUTRITION

Pensez à réaliser vos pesées entrée hiver pour réaliser les plans prévisionnels de fumure en février. Si cette tâche vous semble trop chronophage et approximative pour gérer vos Colzas (et nous partageons cet avis !!), il suffira d'opter pour un suivi par FARMSTAR.

FARMSTAR

OFFRE ÉCO COLZA GROUPE CARRÉ

LES AVANTAGES

- **Carte de modulation de dose pour chaque parcelle ou une dose moyenne à apporter**
- **Un conseil de fractionnement si les besoins sont supérieurs à 100 U**
- **Jusqu'à 25 unités/ha d'azote économisées en colza**
- **Simplicité d'utilisation, en cas de question vous avez un support téléphonique dédié.**

L'offre ECO FARMSTAR est disponible pour le blé, colza et colza associé.

CONCRÉTEMENT, QU'EST-CE QUE C'EST ?

- **Farmstar, vous permet d'optimiser l'apport de chaque unité d'azote : la bonne dose au bon moment au bon endroit.**
- Un conseil unique en sortie d'hiver, calculé par **image satellite** sur vos parcelles : mesure de la chlorophylle et de la biomasse.
- Un tarif accessible : **11€/ha pour le colza**
- Une préconisation robuse et fiable qui a fait ces preuves depuis plusieurs années.

Terres Inovia

Une question sur Farmstar ? Contactez votre technicien ou Valentine Duneugardin (06 45 72 27 87) de la Ferme Pilote.

Retour sommaire : Cliquez ici



LA MÉTÉO DES CULTURES

LA FERME PILOTE
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

L'ACTU EN PLAINE
DU 09/11/2026

COLZA

ET SI ON DOIT RETOURNER?

Globalement, la plupart des herbicides permettent l'installation d'un Blé moyennant un bon labour et/ou un délai (cf Tableau Terres Inovia). C'est la Napropamide à pleine dose qui pose le plus de problème de sélectivité pour les céréales

Remplacement de la culture après retournement du colza

Herbicides sur colza	Blé (tendre et dur)	Pois d'hiver	Féverole d'hiver	Orge de printemps	Maïs	Tournesol	Soja	Betterave	Pois de printemps	Féverole de prinemps	Lin graine de printemps	Sorgho	Ray-grass	Moutarde	Chanvre	Colza de printemps	Pomme de terre	Lentille
napropamide																		
ALABAMA	120j			120j														-
AXTER																		-
BRANDO		60j	60j												-			-
BRANDO 1,25 l/ha + TEROX 1,25 l/ha	(7)	60j	60j												-			-
BUTISAN S/SULTAN/RAPSAN 500 SC															-			
CALLISTO	-			-				-			-	-	-	-	-	-	-	-
CENT 7		-	-					-		-		-	-	-	-		-	
COLZOR TRIO 4 l/ha															-			-
COLZOR TRIO 2,5 l/ha															-			-
COLZOR UNO															-			-
IELO					120j (5)	150j		120j				120j (5)	210j	90j	-	90j		
FOX													-	-	-			-
LADIVA	30j			30j	30j	150j		120j			-	30j	30j	30j	-			
LONTREL 100 ou SG	-						120j								-		120j	
MOZZAR/BELKAR	30j			30j	30j	(6)		(6)			(6)	30j	30j		-			
NERO + métazachlore								(2)	(2)	-	-	-	-	-	-		-	-
NERO			-	(2)				(2)		-	-	-	(2)	-	-			
BODY, CIRCUIT, métazachlore + clomazone															-			-
NOVALL/BANDONEON																		-
RAPSAN TDI + CENTIUM 36 S	120j			120j						120j		-	-	-	-			-
SPRINGBOK	140j	(3)	(3)	140j					(3)	(3)	-			-				
TANARIS/SOLANIS																		-
TRIVALDI	120j			120j	120j	180j		150j			120j	120j	120j	120j	-	120j		
propyzamide (KERB FLO, etc.)					120j (5)			120j				120j (5)	210j		120-150j		30j	
Anti-graminées foliaires (AGIL, FUSILADE MAX, etc.)																		

Culture possible sans restriction (quel que soit le travail du sol préalable)
Culture possible à condition de faire un labour profond
Culture déconseillée
Parfois risque de feinage après un labour. Ce risque, peu fréquent est grave après un automne ou un hiver sec. Ce risque peut être encouru si les avantages économiques du remplacement s'avèrent insuffisants.

- Pas d'information suffisante ou cas peu probable

Mélanges et/ou programmes : dans ce cas, raisonnez par rapport à l'herbicide le plus restrictif.

(1) Blé tendre et blé dur de printemps.
(2) Avec un travail du sol sur au moins 10 cm.
(3) Cultures non destinées à l'alimentation humaine.
(4) Pour tournesol Clearfield et ExpressSun, culture possible sans labour.
(5) Maïs et sorgho : 90 jours pour une implantation avec labour.
(6) Tournesol et betterave : 120 jours pour la dose de 0,25 l/ha et 150 jours pour la dose de 0,5 l/ha. Lin : 90 jours à la dose de 0,25 l et 120 jours à la dose de 0,5 l.
(7) Blé tendre et blé dur d'hiver uniquement. Attendre 60 jours. Déconseillé sur blé de printemps.
Sources : firmes

Mise à jour : juillet 2025

Retour sommaire : Cliquez ici



LA MÉTÉO DES CULTURES

LA FERME PILOTE
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

L'ACTU EN PLAINE
DU 09/11/2026

SEMIS DES CÉRÉALES D'AUTOMNE

Les semis de Novembre, c'est aussi des positionnements de graines plus approximatifs donc des risques de phyto plus importants. D'ailleurs, on a observé des orges pâlir sévèrement ces derniers jours. En général, un petit coup de « vas-y pépère » comme **MYSA 1 l/ha** suffit à lui redonner des couleurs

Évitez l'ACLONIFEN en post-levée : c'est sans aucun doute la matière active la plus agressive pour les céréales. Si elle peut passer en blé, elle est carrément délétère en orge. Le Prosulfocarbe, lorsqu'il est associé, est également à proscrire en orge

En cas de graminées ayant passé le stade 1-2 feuilles, et en espérant que ça réponde encore (diagnostic à réaliser en fonction de votre historique), seules des bases foliaires pourront les rattraper. Malheureusement, il n'y en a pas 50 homologuées à l'automne car si **ALKERA** (pinoxaden) ou les sulfos traditionnelles (**ATLANTIS, OLBLAK DUO**) auraient de bonnes efficacités, elles sont interdites en ce moment.

Il reste donc :
MEDZO 1,5 l/ha (DFF + iodosulfuron + mésosulfuron)
FENOVA SUPER 1 l/ha (Fenoxaprop)
DYVEL 0,6 l/ha (Clodinafop)

Dans nos essais, une association double sulfos/ fop comme **MEDZO 1,5 l/ha + DYVEL 0,5 l/ha + DIFFUZ 0,5 l/ha + PHYDEAL 0,25 %** donne de très bons résultats. À ne surtout pas mélanger au Chlorotluron pour risque de phytotoxicité avec l'huile.
Dans tous les autres cas, les solutions habituelles feront le job



Photo prise le 03/11

SEMIS DES CÉRÉALES D'AUTOMNE

Quali'Cible

Quali'Cible | Produits

RAVAGEURS: surveillez les pucerons !!

Avec les températures annoncées, la levée devrait être très rapide et les pucerons toujours présents : prévoir dès le stade 1 feuille une protection de type **SPLIT EXPERT 0.05 l/ha + ACTEON 0.05%**


Figure 1 : Relation entre températures et activité des pucerons



Durée de vie :
30 à 40 jours à 15 °C
2 mois à 10 °C

En dessous de 3°C, les pucerons ne sont plus actifs mais peuvent survivre

Mort si la température descend en dessous de
- 5 à -12 ° C



Mort à partir de 30 ° C

La rapidité de ponte augmente avec la température jusqu'à 25 °C, ensuite elle décroît

A 20°C, 8 jours sont nécessaires aux larves pour atteindre le stade adulte. L'insecte peut encore vivre 15 à 20 jours.

L'activité de vol ne démarre qu'à partir de 12 °C

Attention : Variations de ces valeurs selon les espèces de pucerons.

➔ **Des étés tempérés suivis d'automnes doux sont particulièrement favorables aux pucerons d'automne.**

LIN D'HIVER

PROSCRIRE TOUTE CLÉTHODIME pour risque de gel de la culture si un coup de froid arrivait dans le mois qui vient

Certaines parcelles arrivent déjà à 6/8 cm : dans ce cas, il faut envisager un passage de **CARYX 0.3 à 0,5 l/ha + PENTRA 0,15 %**



Parcelle de lin d'hiver, semée le 02/10 à Gouy-sous-Bellonne (62) - photo prise le 09/11



LA MÉTÉO DES CULTURES

LA FERME PILOTE
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

L'ACTU EN PLAINE
DU 09/11/2026

NOS OFFRES À POURVOIR

Agent de maintenance - F/H - CDI - Gouy-Sous-Bellonne

Gestionnaire Trésorerie - H/F - CDI - Gouy-sous-Bellonne

Gestionnaire Facturation - H/F - CDI - Gouy-sous-Bellonne

Technico-commercial - H/F - CDI - secteur Saint-Amand-les-Eaux

Vous souhaitez nous rejoindre mais aucune offre ne correspond pas à votre profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature spontanée : ***https://jobs.world.luccasoftware.com/groupe-carre/candidature-spontannee-d2e5867f-c127-4c1f-a928-fab5e6675609***

Pour consulter l'ensemble de nos offres d'emploi, *cliquez ici*.
N'hésitez pas à en parler autour de vous !